



## Protocol voor BHV'ers en zorgprofessionals

# Coronavirus - reanimatiebeleid in justitiële inrichtingen

7-4-2020

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft vanwege de coronacrisis het reanimatiebeleid (tijdelijk) aangepast. In dit protocol is het nieuwe reanimatiebeleid aangepast aan de situatie in de justitiële inrichtingen. Buiten de justitiële inrichtingen geldt het reanimatieprotocol zoals vermeld in de 'rijksbrede richtlijnen werkgevers sector Rijk i.v.m. het coronavirus (COVID-19)'.

### Wie zijn inzetbaar voor reanimatie van volwassenen?

BHV'ers en medisch personeel (hulpverleners) kunnen met een FFP-2 mondmasker allen ingezet worden voor een reanimatie.\*

\* Zonder FFP-2 mondmasker, kunnen alleen hulpverleners onder de 50 jaar die niet behoren tot een risicogroep ([zie RIVM](#)), voor een reanimatie worden ingezet. Ook een hulpverlener die zich ziek voelt of van wie iemand in het huishouden ziek is ([zie RIVM](#)), mag zonder FFP-2 masker niet worden ingezet.

### Belangrijkste wijzigingen

- Geef geen mond-op-mond beademing bij volwassenen!  
Pocketmasks, face-shields (kiss of life) zijn niet veilig en mogen niet worden gebruikt.
- Luister en voel niet naar de ademhaling door oor/wang boven de mond van de patiënt te houden!

### TIP

Plaats vijf FFP-2 mondmaskers in iedere hoek van de AED's en in de reanimatie noodkoffer van de medische dienst en verwijder de aanwezige pocketmasks en kiss of life.

## Reanimeren - wie en op welke manier?

Elke hulpverlening begint met het bewaken van de eigen veiligheid.

### 1. Bel 112

### 2. Controleer ademhaling

- niet luisteren
- kijk of de borst omhoog komt
- voel of de buik omhoog komt door gespreide vingers te plaatsen op de bovenbuik (maagkuiltje) net onder de borstkas met de vingers naar het hoofd wijzend

### 3. Volwassenen zonder bewezen of veronderstelde coronavirusinfectie

Draag waar mogelijk een FFP-2 masker en handschoenen.

- geef geen mond-op-mond beademing
- geef alleen beademing met een ambu bag/masker-ballon middels de 4-handen/2 personen techniek, wanneer een FFP-2 mondmasker gedragen wordt. Deze handeling is voorbehouden aan bevoegd en bekwaam medisch personeel.
- geef wel borstcompressies
- gebruik een AED



### 4. Persoon met bewezen of veronderstelde coronavirusinfectie

Draag een FFP-2 mondmasker, handschoenen, spatbril en schort met mouwen.

De reanimatie wordt bij voorkeur door medisch personeel uitgevoerd.

- geef geen mond-op-mond beademing
- geef geen beademing met een ambu bag/masker-ballon\*
- geef wel borstcompressies
- gebruik een AED

\* Bij het medisch personeel van DJI bestaat onvoldoende ervaring met masker-ballon beademing middels de 4-handen/2 personen techniek, om deze techniek veilig toe te passen bij een COVID-19 patiënt.

### 5. Kinderen (< 18 jaar) zonder verdenking of bewezen coronavirusinfectie

De reanimatierichtlijn voor kinderen is ongewijzigd. Als er geen sprake is van een (mogelijke) coronavirusinfectie, pas je dus WEL mond-op-mond beademing toe.

### 6. Na de reanimatie de handen wassen/desinfecteren

#### Colofon

Dit protocol is een publicatie van:  
Outbreak Management Team van  
Dienst Justitiële Inrichtingen  
Postbus 30132  
2500 GC Den Haag

Dit protocol is bedoeld voor intern gebruik bij DJI.  
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dit protocol.

© Dienst Justitiële Inrichtingen, 7 april 2020