

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	Patiënten met (ernstige) acute luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	Ziekenhuismedewerkers met klachten: • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen	• Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

Buiten het ziekenhuis:			
Huisartsenzorg	Patiënten uit de risicogroep* Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg/hospice) Uitwerking door NHG	Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten: • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen**	• Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
GGD'en	Patiënten verdacht voor COVID (indien nodig voor bestrijding) Patiënten uit de risicogroep* Zorgmedewerkers met klachten van andere organisaties buiten het ziekenhuis	GGD-medewerkers met klachten • Thuisblijven	• Bestrijdingsmaatregelen zoals contactonderzoek in regio's waar geen wijdverspreide transmissie is • Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis
Thuiszorg	Niet van toepassing Indicatie stelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)	Thuiszorgmedewerkers met klachten: • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden • PBM-gebruik • Testen**	• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Verpleeghuis (lichamelijk kwetsbare patiënten)	Patiënten verdacht voor COVID Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn VERENSO	Verpleeghuis-medewerker: • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen**	• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (cohortering of isolatie) • Isolatie en bescherming verpleeghuispopulatie

			en medewerkers • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Gehandicapten-zorg (woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)	Patiënten verdacht voor COVID Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn VGN	Medewerkers gehandicaptenzorg: • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden • PBM-gebruik • Testen**	• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (cohortering of isolatie) • Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten en medewerkers • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Intramurale GGZ patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn GGZ-NL	Mogelijkheden tot: • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek: • PBM-gebruik • Testen	• Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Instellingen voor Jeugdzorg mogelijk gedragsproblemen	Op indicatie van wie bij gedragsproblemen	Groepswerkers: • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden	• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Ambulancezorg	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in	Ambulancemedewerkers met klachten: • Thuisblijven	• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

	ziekenhuis	• Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen**	
NIVEL- huisartsen- peilstations	Alle patiënten met griepachtige klachten	n.v.t.	• Surveillance

* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

** indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus!