

RIVM: CHIRURGISCHE MASKERS BIEDEN, ONDER VOORWAARDEN, VOLDOENDE BESCHERMING

Chirurgische maskers bieden, onder voorwaarden, voldoende bescherming tegen besmetting met het Corona-virus. Dit zegt het RIVM in een herziene richtlijn over het gebruik van mondneusmaskers.

Uitgangspunt is dat een masker gezondheidsmedewerkers adequate veiligheid moet bieden bij de verzorging en behandeling van een patiënt met COVID-19. Volgens het RIVM biedt een FFP1 masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten verzorgen met COVID-19. Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij veel druppels kunnen vrijkomen, zoals bronchoscopie, tracheale intubatie en niet invasieve beademing. Hiervoor wordt een FFP2 masker geadviseerd.

Een FFP/chirurgisch masker mag aan één stuk worden gedragen tot het moeilijker wordt om te ademen (3-4 uur) of tot het masker heel nat wordt. Maskers hoeven anders dan handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar.

Gebruikte FFP en chirurgische maskers moeten worden bewaard voor (her-)sterilisatie en later hergebruik. De methoden hiervoor worden nader onderzocht.

Lees hier het volledige advies.