

### Aanpassingen afwegingskaders voor jeugd domein en onderwijs

Waarom deze aanpassing:

Tijdens de eerste coronagolf is het mentale welbevinden van kinderen en jongeren teveel ondergeschikt gemaakt aan de generieke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Nu de coronacrisis langer voortduurt is aanpassing noodzakelijk om de mentale schade bij kinderen en jongeren te beperken. Dit geldt zeker voor kinderen en jongeren die al zorg ontvangen. Zij zijn extra kwetsbaar.

Evaluatie van de eerste coronagolf:

- Kinderen en jongeren van gescheiden ouders hebben soms te lang de andere ouder niet kunnen ontmoeten.
- Kinderen en jongeren in de residentiële zorg, gezinshuizen en pleeggezinnen te lang geen bezoek van ouders of dierbaren kunnen ontvangen.
- Kinderen en jongeren hebben te vaak een discontinuïteit in hun behandeling/ondersteuning/begeleiding vanuit de jeugdhulp ervaren.
- Isolatie en quarantaine van kinderen en jongeren in de residentiële zorg was teveel alleen gericht op de voorkoming van de verspreiding van het virus en sloot onvoldoende aan bij hun leeftijd en ontwikkelniveau.

Na evaluatie zijn daarom de volgende uitgangspunten voor een eventuele tweede coronagolf geformuleerd:

- In het contact met kinderen en jongeren en bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen staat het mentale welzijn van kinderen en jongeren voorop.
- Elk kind en elke jongere heeft op zijn tijd fysieke nabijheid nodig. Niet elk contact is vervangbaar door digitaal contact. Fysiek contact moet ten alle tijden mogelijk zijn. Zo nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.
- Angst of fysieke kwetsbaarheid van kinderen, ouders of andere huisgenoten mag geen belemmering zijn voor de inzet van jeugdhulp. Zo nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet om de hulp toch mogelijk te maken.<sup>1</sup>
- Als isolatie of quarantaine van het kind of de jongere nodig is, gebeurt dit op een kindvriendelijke manier die aansluit bij leeftijd en ontwikkelniveau van het kind of de jongere.
- Bezoek van ouders of andere dierbaren blijft altijd mogelijk. Het kan zijn dat dit op een andere locatie dan normaal plaatsvindt. Zo nodig worden PBM ingezet.
- Bij het gebruik van PBM wordt het soort mondmaskers zoveel mogelijk afgestemd op het kind. Zo zal voor contact met kinderen met een auditieve beperking voor 'doorzichtige' maskers gekozen worden. Dit kan ook voor hele jonge kinderen fijn zijn. Kinderen met benauwdheidsklachten door bijvoorbeeld chronische longproblemen geven aan zelf liever 'shields' te gebruiken omdat chirurgische mondmaskers hun gevoel van benauwdheid versterkt.

<sup>1</sup> Het preventief gebruik van PBM is gericht op het mentale welbevinden van kinderen en jongeren. Het doel is om contact, nabijheid, zorg en onderwijs mogelijk te blijven maken waar dat anders niet plaats zou kunnen vinden, bijvoorbeeld door kwetsbaarheid, angst of onzekerheid van kind, opvoeders of gezinsleden. Het preventieve gebruik kan een drempel verlagen en gaat altijd gepaard met gesprek, gezamenlijke afweging en waar mogelijk geruststelling waardoor kind, jongere en/of gezinsleden met steeds meer vertrouwen belangrijke contacten en activiteiten voor de ontwikkeling van het kind of de jongere, in de huidige coronacontext weer op kunnen pakken. Preventief gebruik kan van tijdelijk aard zijn.

	Kind of jongere zonder klachten	Kind of jongere zonder klachten. Kind of jongere of ander gezinslid kwetsbaar	Kind of jongere met klachten (al dan niet kwetsbaar)
<p><b>In relatie tot klachten en corona testen:</b></p> <p>Kinderen: t/m 12 jaar cq basisschool en BSO</p> <p>Jongeren: 13 tot 18 jaar, cq voortgezet onderwijs en VSO</p>	<p>Als je zelf getest bent op corona en de test is negatief, mag je met milde klachten, zonder koorts weer aan het werk. De 'normale' regels hieronder volstaan.</p> <p>Als je als professional klachten hebt en in afwachting bent van de testuitslag blijf je thuis.</p> <p>Kinderen en jongeren met klachten die verzorging van anderen nodig hebben worden getest.</p> <p>Voor het onderwijs geldt dat jongeren (&gt; 13 jaar) met klachten getest worden. Tot de testuitslag bekend is blijven zij thuis.</p> <p>Als je als professional in de 2 dagen voorafgaand aan de klachten van het kind of de jongere fysiek contact, fysieke nabijheid of persoonlijke verzorging hebt gehad (allen &lt; 1,5 meter) met dit kind of de jongere, mag je blijven werken. Je moet bij persoonlijke verzorging, fysieke nabijheid, fysiek contact of lichamelijk onderzoek (allen &lt; 1,5 meter) tot 14 dgn na dit contact een chirurgisch mondmasker en handschoenen dragen. Je werkt in deze periode bij voorkeur niet met kwetsbare kinderen/jongeren of in aanwezigheid van kwetsbare gezinsleden.</p> <p>Je doet als je langer dan 15 minuten onbeschermd contact op minder dan 1,5 meter hebt gehad of korter dan 15 minuten hoog-risicocontact (bijv in het gezicht spugen) met iemand die positief test op corona mee aan het BCO van de GGD.</p>		
<p><b>FTF of vluchtig (&lt;5 min) fysiek contact</b></p> <p>= Contact op &gt; 1,5 meter of kortdurend &lt; 1,5 meter</p>	<p>Alg. hygiëne maatregelen</p> <p>Als de professional in het BCO zit vult hij de algemene hygiëne maatregelen aan met fysieke barrières of PBM: chirurgisch mondmasker.</p>	<p>Alg. hygiëne maatregelen evt preventief aangevuld met fysieke barrière (scherm) of PBM (chirurgisch mondmasker) – kiezen of dit door de kwetsbare of door de andere personen gedragen wordt.</p>	<p>Alg. hygiëne maatregelen evt preventief aangevuld met fysieke barrière (scherm) of PBM (chirurgisch mondmasker) te dragen door de professional.</p> <p>Professionals/bezoekende familieleden die zelf tot de risicogroep behoren of die 28 weken of langer zwanger zijn overleggen of zij werkzaamheden kunnen verrichten/contact mogelijk is waarin de anderhalvemeterregel kan worden gewaarborgd</p>
<p><b>Persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek</b></p> <p>=contact op &lt; 1,5 meter waarbij je ook (medische/zorg) handelingen aan het</p>	<p>Alg hygiëne maatregelen, evt aangevuld met PBM die voor corona ook al gebruikt werden voor het hygiënisch uitvoeren van</p>	<p>Alg. hygiëne maatregelen evt preventief aangevuld met fysieke barrière (scherm) of PBM (chirurgisch mondmasker) – kiezen</p>	<p>Alg. hygiëne maatregelen aangevuld met PBM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handschoenen</li> <li>• Bril.</li> <li>• Chirurgisch mondmasker</li> <li>• Schort of (dokters)jas met lange mouwen.</li> </ul>

<p>lichaam verricht</p>	<p>medische handelingen. (bijvoorbeeld stoma of catheter wisselen).</p> <p>Als de professionals in het BCO van de GGD zit, ziet hij hier zoveel mogelijk van af en vraagt een collega zonder klachten/BCO de handelingen over te nemen.</p>	<p>of dit door de kwetsbare <u>of</u> door de omstanders gedragen wordt.</p> <p>Als de professionals in het BCO van de GGD zit, ziet hij hier zoveel mogelijk van af en vraagt een collega zonder klachten/BCO de handelingen over te nemen.</p>	<p>Als de persoonlijke verzorging intensief contact met de luchtwegen geeft (bijvoorbeeld uitzuigen) dan gebruik je naast de alg. hygiëne maatregelen PBM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handschoenen.</li> <li>• Bril.</li> <li>• FFP2 masker.</li> <li>• Schort.</li> </ul>
<p><b>Fysieke nabijheid</b></p> <p>= contact op &lt; 1,5 meter waarbij je geen (medische/zorg) handelingen aan het lichaam verricht (anders dan bijvoorbeeld een knuffel)</p> <p>De regels voor fysieke nabijheid gelden ook voor ouders/opvoeders/familie die bij kinderen/jongeren op bezoek komen</p>	<p>Probeer het aantal betrokken personen zo klein mogelijk te houden</p> <p>Voor kinderen tot en met 12 jaar gelden geen beperkingen</p> <p>Voor jongeren vanaf 13 jaar: doe het alleen als nodig.</p> <p>Bij twijfel (bijvoorbeeld om dat de jongere niet goed uit kan leggen of hij klachten heeft) kun je preventief PBM, chirurgisch mondmasker gebruiken.</p> <p>Als de professional in het BCO van de GDD zit gebruikt hij PBM: chirurgisch mondmasker en handschoenen.</p>	<p>Probeer het aantal betrokken personen zo klein mogelijk te houden</p> <p>Voor kinderen tot en met 12 jaar gelden geen beperkingen.</p> <p>Voor jongeren vanaf 13 jaar: doe het alleen als nodig.</p> <p>Bij twijfel of onzekerheid bij de het kwetsbare kind/de jonger of gezinsleden kun je preventief PBM – een chirurgisch mondmasker gebruiken. - kiezen of dit door de kwetsbare <u>of</u> door de omstanders gedragen wordt.</p> <p>Als de professional in het BCO van de GDD zit gebruikt hij PBM: chirurgisch mondmasker en handschoenen.</p>	<p>Probeer het aantal betrokkenen personen zo klein mogelijk te houden</p> <p>Alg. hygiëne maatregelen aangevuld met PBM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handschoenen</li> <li>• Bril.</li> <li>• Chirurgisch mondmasker</li> <li>• Schort of (dokters)jas met lange mouwen.</li> </ul>