

**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl;  
**Cc:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e) (10)(2e)  
**Sent:** Tue 5/19/2020 6:15:38 PM  
**Subject:** RE: Antw: asymptomatische transmissie  
**Received:** Tue 5/19/2020 6:15:39 PM

Hoi (10)(2e),

Misschien goed om toe te voegen dat huisgenoten nadrukkelijk gevraagd wordt om zich te melden en te laten testen als zij klachten krijgen.

Als blijkt dat er wel transmissie is in het huishouden, kan het bco daarop aangepast worden voor andere contacten.

(10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Verzonden op:** dinsdag 19 mei 2020 19:21

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl> (10)(2e)

<(10)(2e)@rivm.nl>

**CC:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Antw: asymptomatische transmissie

Hoi (10)(2e), anderen,

Oké, de huisgenoten dus wel direct in quarantaine. Maar categorie 2 contacten worden niet geïnventariseerd. Juist omdat er nog onduidelijkheid is over de bijdrage van asymptomatische transmissie lijkt het me belangrijk om hier in eerste instantie aan de veilige kant te gaan zitten en in elk geval categorie 2 contacten ook mee te nemen, en 3 bij voorkeur ook. Juist omdat iemand geen klachten heeft zijn er mogelijk wel meer contacten geweest en hoewel de kans misschien wel kleiner is dat daar iemand van besmet is, zou je er absoluut gezien wel besmettingen door kunnen missen als je ze niet meeneemt. Nu BCO weer opgestart wordt hebben we juist de kans om hier meer info over te krijgen en het beleid bij te stellen op basis van evidence.

Groet,

(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Sent:** dinsdag 19 mei 2020 17:51

**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e)

<(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Subject:** RE: Antw: asymptomatische transmissie

Ja, dat klopt.

Als iemand na 24 uur klachten krijgt, wordt het BCO uiteraard eerder opgestart.

De huisgenoten gaan wel direct in quarantaine, die wordt opgeheven als de index asymptomatisch blijft.

Groet, (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Verzonden:** dinsdag 19 mei 2020 16:39

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e)

<(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Antw: asymptomatische transmissie

Voor mijn begrip: Als iemand positief test maar nog geen klachten heeft, moet hij dan 3 dagen in isolatie en kan wordt daarna besloten of BCO gestart wordt?

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

dubbel

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

dubbel

(10)(2e) (10)(2e)