

**To:** (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Thur 2/20/2020 9:57:02 PM  
**Subject:** Doorst: aandeel pre-symptomatische besmettingen  
[notitie transmissievoorsymptomen\\_20200220.pdf](#)

Wie heeft hen dit gevraagd?

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Datum:** 20 februari 2020 om 22:42:31 CET  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Onderwerp:** aandeel pre-symptomatische besmettingen

Beste (10)(2e)

Hier een notitie n.a.v. een vraag uit LCI: hoeveel van de besmettelijke contacten met COVID-19 worden gemaakt in de presymptomatische fase? Het antwoord is 70%, op basis van ca 80 transmissieclusters in China. Dat is heel veel hoger dan ik had gedacht, en geeft te denken over de effectiviteit die we mogen verwachten van het zelf-monitoren van hoog-risico contacten.

Vriendelijke groeten,

(10)(2e)