



Ik kreeg van (10)(2e) 2 vragen mbt BCO richtlijn:

- Kunnen we een maximale besmettelijke periode aangeven? Voor patiënten waarvan de symptomen lang aanhouden, terwijl we weten dat de besmettelijkheid door de tijd heen afneemt, zeker bij niet-immuun gecompromiteerden. Ik cc (10)(2e) (10)(2e) met de vraag wie daar naast haarzelf nog meer goed in zit, omdat (10)(2e) binnenkort vakantie heeft.
- Wanneer hertesten? In geval men eerst negatief was, bij nieuwe klachten, wanneer opnieuw testen? Daar lijkt me een eenvoudiger voorstel voor te maken, bv als nieuwe klachten. En tenminste na 48 uur, zodat je een indicatie hebt dat er een nieuwe aandoening/COVID kan zijn en de nieuwe klachten niet in relatie staan tot de voorgaande klachten.

(10)(2e) kun je beide vragen iig op het responsteam voor a.s. vrijdag agenderen?

Dank

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

Postbus 1 (10)(2e)

3720 BA Bilthoven

Tel: 030 (10)(2e)

Fax: 030 (10)(2e)