

### Lijstje adviesvragen RIVM (of andere experts) ivm routekaart ghz thuis

Een deel van de doelgroep mensen met een beperking is qua gezondheid verhoogd kwetsbaar. Ten aanzien van gezondheidsrisico's zijn er twee factoren relevant. Het RIVM onderscheidt deze twee factoren ook op hun site:

- Verhoogde kans op besmetting
- Verhoogde kans op een ernstig beloop

#### *Verhoogde kans op besmetting*

Bij het eerste heeft het RIVM al op de site staan dat het om gaat om mensen met een verstandelijke beperking in een instelling of mensen in een verpleeghuis. Het is ons niet duidelijk wat de relevantie hiervan is.

→ Vraag aan het RIVM is dan ook wat de relevantie is van het onderscheiden van groepen met een verhoogde kans op besmetting. Wat betekent dit bijvoorbeeld in termen van (eventueel aanvullende) noodzakelijke maatregelen?

Een groot deel van de groep mensen met een beperking heeft zorg en ondersteuning nodig binnen 1,5 meter. Een deel van deze groep loopt bovendien een verhoogd gezondheidsrisico.

→ Vraag aan het RIVM is of iedereen die dagelijks zorg en ondersteuning nodig heeft binnen 1,5 meter zou moeten worden toegevoegd aan de groep die een verhoogd risico loopt op besmetting.

→ Zo ja, wat betekent dat in termen van noodzakelijke maatregelen? Of, en zo ja welke, maatregelen zijn nodig bovenop de standaardmaatregelen van handen wassen etc.

#### *Verhoogde kans op een ernstig beloop*

Ten aanzien van een verhoogd risico op een ernstig beloop bestaat behoefte om duidelijkheid te krijgen over een specifieke groep, namelijk degenen met een contra-indicatie voor een ic-opname. Cliëntenorganisaties geven aan dat dat bijvoorbeeld geldt voor een groep die vanwege rolstoelgebondenheid te maken heeft met spierzwakte.

→ Vraag is daarom aan het RIVM (of wellicht aan andere partijen) of er inderdaad een groep is met contra-indicatie voor IC-opname en zo ja welke groep is dat?

→ Betekent die eventuele contra-indicatie extra preventie voor deze groep is aangewezen en, zo ja, welke preventieve maatregelen zijn dan nodig?

Specifiek voor bezoek (thuis of in een instelling) bestaat bij cliëntenorganisaties de wens om duidelijkheid over nut en noodzaak van preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

→ Vraag aan het RIVM is daarom: Zijn bij bezoek aan mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop aanvullende preventieve maatregelen nodig (bovenop de algemeen geldende) en, zo ja, welke zijn dat?