

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 5/18/2020 12:45:42 PM
Subject: RE: geslachtsverschillen in prevalentie COVID
Received: Mon 5/18/2020 12:45:43 PM

Hi (10)(2e)

Ik zou antwoorden dat we het artikel binnenkort submitten en daarna refereren mogelijk is. Nu is dit op basis van OMT stukken nog niet mogelijk denk ik. Ze kan het wel al gebruiken, lijkt mij.

Ik weet niet wat haar timelines zijn?

Gr (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 18 mei 2020 13:46
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: geslachtsverschillen in prevalentie COVID

Hoi (10)(2e)

Even een kort vraagje, kan aio van (10)(2e) al refereren naar de voorlopige eerste pienter resultaten mbt geen verschil in seroprevalentie naar geslacht of zeg je, maar even wachten totdat we manuscript hebben gesubmit of in ieder geval alle data hebben bekeken. En het staat alleen in OMT stuk en ik weet niet of je daar naar kan refereren.

Groet (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 18 mei 2020 12:38
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: geslachtsverschillen in prevalentie COVID

Beste (10)(2e)

Dank! Zijn deze eerst resultaten al gepubliceerd of zijn deze resultaten eventueel intern bereikbaar en zou ik hier naar kunnen refereren?

Groet,
(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 18 mei 2020 08:59
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: geslachtsverschillen in prevalentie COVID

Beste (10)(2e)

In onze eerste voorlopige resultaten zagen we geen verschillen in seroprevalentie tussen mannen en vrouwen. Inmiddels zijn alle sera getest van de eerste ronde en (10)(2e) (10)(2e) is nu bezig om dit te analyseren. Over een aantal weken weten we meer.

Groet (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: zaterdag 16 mei 2020 10:13
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: geslachtsverschillen in prevalentie COVID

Beste (10)(2e),

In opdracht van (10)(2e) werk ik aan een stuk over de man-vrouw verdeling in COVID-19 patiënten. Daarbij zijn we o.a. benieuwd naar de verschillen in prevalentie tussen mannen en vrouwen en zou het mooi zijn als we de bevindingen van het PIENTER-onderzoek op dit gebied hierin kunnen meenemen. Worden er bij het PIENTER-onderzoek verschillen waargenomen in de seroprevalentie tussen mannen en vrouwen?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

AIO, Afdeling epidemiologie van respiratoire infecties
RIVM – Centrum Infectieziekten bestrijding
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven
T +31 (10)(2e) | E (10)(2e) @rivm.nl