

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Mon 5/11/2020 3:04:59 PM
Subject: RE: contact fase activatie bij Covid-19
Received: Mon 5/11/2020 3:05:00 PM

Hi,

Yes sure! interesting to explore. I think in any case, we should also include hospitalized (and IC) patients as most of the FFX individuals have no or mild symptoms (only few hospitalized?). I can contact (10)(2e) (VUMC) who is interested in collaborating and can connect us to the Amsterdam UMC COVID-19 biobank (hospitalized and IC patients). Let me know when you want to brain-storm.

Regards,

(10)(2e)

From: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Sent: maandag 11 mei 2020 16:34
To: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Subject: contact fase activatie bij Covid-19

Hi all,

In bijgevoegd artikel wordt gesuggereerd dat bradykinine formatie (door contact fase activatie) een rol speelt bij de verergering van Covid-19 symptomen. Dit lijkt samen te vallen met antistofvorming (dus mogelijk een negatief effect van Abs?).

(10)(2g)

Alle genoemde assays lopen (10)(2e) bij Sanquin, waar (10)(2e) nu groepsleider is. Zij zijn enthousiast om samen te werken, mij lijkt het ook een mooie aanvulling op de assays die wij zelf (kunnen) doen in de FFX-samples.

Wat denken jullie? Zullen we eens brainstormen over deze aanvullende (innate) assays? En dan binnenkort een keer met (10)(2e) bellen?

Hoor graag van jullie!

Groet (10)(2e)