

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 4/27/2020 5:29:40 PM
Subject: IgM en "nulwaarde" seropos.
Received: Mon 4/27/2020 5:29:41 PM

Hallo,

Nog ter overweging...

Voor PIENTER Corona studie zou het interessant zijn om nog naar S1-specifieke IgM Ab's te kijken. Geeft toch inzicht in meer recente infecties. Realiseer me wel dat dit ook weer extra werk voor lab is, maar juist als je naar effect van maatregelen wil gaan kijken relevant, lijkt mij. Ook leuk om IgM vs IgG van tijdstip 1 met tijdstip 2 te kunnen vergelijken.

Hoeft overigens, lijkt mij, niet in eerste paper (eerste SARS-CoV-2 seroprevalentie paper zou ik echt z.s.m. indienen).

Voor het eerste paper lijkt het me wel goed om de S1-seropositieve samples toch nog een keer te meten (duplo). Ook zou ik hiervan de "nulwaarde" voor bepalen (ofwel de gematchte PIENTER 3 samples van de S1-seropos.), om na te gaan of ze niet toevallig al erg hoog (of mooi laag) waren in pre-COVID-19 tijdperk. Wat denken jullie?

Groet,

(10)(2e)