


To: (10)(2e) | (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) @rivm.nl;
From: (10)(2e)
Sent: Thur 9/24/2020 11:06:38 AM
Subject: RE: Planning for Olink measurements
Received: Thur 9/24/2020 11:06:38 AM

I will ask (10)(2e) to make an overview of available sample with sufficient volume.
For participants <16 years we only have a small volume of serum at time point 3, so for children we will only have 2 timepoints.
We can provide 1 aliquote that has not been unfthawed before but not 2 per participant/timepoint.
(10)(2e)



Dubbel


(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)



Dubbel