

De KNMP heeft de LMWH's doorgegeven aan VWS als voorbeeld van geneesmiddelen die worden toegepast in zowel de eerste als tweede lijn (in het kader van verdelingsvraagstukken). In de behandelprotocollen voor COVID-19-patiënten in zowel de eerste als tweede lijn worden deze geneesmiddelen genoemd. Het vinden van goede alternatieven is lastig indien deze geneesmiddelen niet leverbaar zijn. Er zijn verschillende andere geneesmiddelen met een soortgelijk werkingsmechanisme, maar deze middelen kennen belangrijke nadelen zoals het risico op bloeding. LMWH's kennen dit risico op bloeding ook. Voordeel bij LMWH's is echter dat hierop makkelijk 'bij te sturen' is. De apotheekbereiding is inderdaad geen alternatief.

De KNMP heeft van de zomer geïnventariseerd bij het NHG, de LHV en Verenso aan welke geneesmiddelen behoefte is bij de behandeling van COVID-19 in het geval van een tweede golf. Dit om een beeld te krijgen van de behoefte in de eerste lijn. De LMWH's zijn door de organisaties genoemd, dat was ook een reden om dit voorbeeld te noemen richting VWS. Voor de volledigheid is onderstaand de volledige, samengevoegde lijst vermeld.

- Amoxicilline/clavulaanzuur
- Azitromycine
- Buprenorfine (transdermal, sublingual)
- Ciprofloxacin
- Claritromycine
- Clonazepam
- Codeïne
- Cotrimoxazol
- Diazepam (oraal en rectaal)
- Domperidon
- Doxycycline
- Erytromycine
- Fenoterol
- Fentanyl (ROO's, transdermaal)
- Haloperidol (ampullen en druppels)
- Ipratropium (inhalatie)
- Levomepromazine (oraal, parenteraal)
- LMWH's
- Lorazepam
- Metoclopramide
- Midazolam (oraal, parenteraal, neusspray)
- Mirtazapine
- Morfine (oraal, rectaal, parenteraal)
- NaCl infusievloeistof
- NSAID's
- Oxazepam
- Oxycodon (oraal)
- Paracetamol
- Predniso(lo)n
- Promethazine
- Salbutamol (inhalatie)
- Temazepam
- Tramadol
- Vloeibare voeding
- Zuurstof