

**To:** (10)(2e) | (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e) (10)(2e)  
**Sent:** Thur 7/2/2020 11:01:10 AM  
**Subject:** RE: testen asymptomaten bij BCO  
**Received:** Thur 7/2/2020 11:01:00 AM

Mooi! helemaal eens

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)  
Arts M&G, (10)(2e) regionale consultants  
tel.: (10)(2e)  
e-mail: (10)(2e) @rivm.nl  
[www.rivm.nl/infectieziekten](http://www.rivm.nl/infectieziekten)

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Verzonden:** donderdag 2 juli 2020 08:42

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: testen asymptomaten bij BCO

Hi (10)(2e) aanvulling: dit standard beleid om asymptomaten te testen bij dag 4 en dag 8 om infecties eerder op te sporen, los van q-duur, is mij niet bekend/ niet ter ore gekomen, dat vertelde (10)(2e) ook niet.. Ik heb (10)(2e) gister wel aangegeven dat asymptomaten testen echt geen zin heeft.

Inclusief het verhaal wat jij en (10)(2e) mijn vertelden over de app- waarschuwing dat contacten zich moeten laten testen: dat wij echt geen meerwaarde zien om de asymptomaten te testen. En als men zich test moet men meteen thuisblijven in afwachting van de uitslag, en dat is in categorie 3 contacten helemaal niet nodig. Was (10)(2e) het mee eens!


Groet (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)









(1 (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel