



Ervaringen van patiënten met medicijngebruik tijdens de coronacrisis.

CbBG, zorg 7 juni 2020: Eerste resultaten van de peiling in mei

Wie

- Vragenlijst uitgezet in het zorgpanel Patiëntenfederatie.
- Profiel deelnemers (N = 7400)
 - > 51% vrouw / 49% man
 - > gemiddelde leeftijd 65 jaar
 - > 84% van de deelnemers heeft een chronische aandoening waarvan
 - hart- of vaatziekten (27%),
 - reumatische aandoeningen (18%),
 - longaandoeningen (18%),
 - diabetes (17%)



wat

Vragen over (hervatting van de) zorg ten tijde van de corona-crisis.

'n Derde peiling, na eerdere peilingen in maart en mei

Focus:

Ziekenhuiszorg en Huisartsenzorg (maart, april en mei)

Wijkverpleging/thuiszorg en Fysiotherapie (april en mei)

Mondzorg en mantelzorg (mei)

plus

Medicijngebruik (mei)



Let op!

- ☐ Eerste resultaten
- ☐ Ter bespreking in CbBG-zorg, 9 juni 2020.

Niet voor verdere verspreiding / publicatie bedoeld.



Vragen medicijngebruik

'Vraag' =

mogelijkheid tot antwoord: ja/nee/nvt/weetniet + toelichting via een open veld

Ziekenhuiszorg en huisartsenzorg:

Heeft het uitstel van de afspraak gevolgen (gehad) voor eventuele (herhaal)medicijnen die jij/je naaste gebruikt?


Wijkverpleging/thuiszorg en mantelzorger:

Heeft het wegvallen van thuiszorg/wijkverpleegkundige/mantelzorg gevolgen voor eventuele medicijnen die jij of je naaste gebruikt, bijvoorbeeld bij het innemen of toedienen hiervan?



Resultaten

ZKH zorg, n = 3147 & HA zorg n = 2149



Gevolgen Ziekenhuiszorg

Bij Ziekenhuiszorg ervaart dus 1:10 gevolgen.

meest genoemd: verlenging van of zwaardere pijnstilling.

ook: onduidelijkheden stoppen/aanpassing dosering.

'veel meer en zware pijnmedicatie (zonder begeleiding van ziekenhuis want mijn vraag daarover werd niet beantwoord)'

Ook opvallend!?

Bij geen gevolgen: *'goede samenwerking, huisarts nam 't over, recept werd doorgestuurd naar mijn 'eigen apotheek'.*



Gevolgen Huisartsenzorg/Eerste lijnszorg

Bij huisartsenzorg ervaart 1:14 gevolgen.

meest genoemd:	combinatie van 'geen consult/niet bloed kunnen prikken, onduidelijkheden: kan ik wel/niet terecht en waar/voor wat. Nb deels dezelfde opmerkingen bij apotheek.
----------------	---


Ook opvallend!?

Bij <u>geen</u> gevolgen:	<i>'goede samenwerking huisarts-apotheek', recept/medicijnen lagen al klaar, werden bezorgd. etc.</i>
---------------------------	---



Resultaten

Wijkverpleging/thuiszorg n = 381
mantelzorg n = 672



Gevolgen wijkverpleging/thuiszorg

Bij wijkverpleging/thuiszorg ervaart 1:16 gevolgen.

genoemd: *Mantelzorgers moeten nu de medicatie geven en aftekenen.*

pas ik *Meestal krijg ik injecties in mijn schouders maar nu er voor dus meer pijn*
Controle inname is weg

Ook opvallend!?

Bij geen gevolgen vaak: *ik heb een medicijnrol dat gaat prima, ik heb instructie gehad voor gebruik medido.*



Gevolgen mantelzorg

Bij mantelzorg ervaart 1:20 gevolgen.

genoemd: *Medicijnen lagen in brievenbus, moet helpen*
herinneren ze te halen. Soms ging dat niet goed en
kon 1 dag de levothyroxine niet worden
ingenomen.

innemen of mijn schoonmoeder wil niet altijd de medicatie
laten spuiten als er geen bekende bij is

Maar ook bij geen gevolgen:

Thuiszorg doet dat nu, apotheek bezorgt nu etc.



Vragen / discussie

