

Discussiestuk Testbeleid Caribisch Nederland

Gedurende containment fase

Testen bij symptomatische personen

Laag-drempeling PCR-test bij personen met klachten, zowel personen in quarantaine als reguliere populatie. Indicatie voor testen, conform Infact 45:

'Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 EN/OF
 (licht) hoesten
 EN/OF
 Plotsteling verlies van geur en/of smaak (niet veroorzaakt door obstructie van de neus)
 EN/OF
 Kortademigheid/benauwdheid
 EN/OF
 Verhoging óf koorts boven de 38 graden

Aangezien het alleen hebben van spierpijn, vermoeidheid, anorexie/verminderde eetlust en/of hoofdpijn voor de algehele populatie waarschijnlijk te weinig specifiek is, zijn deze symptomen alleen van belang in combinatie met een van de vier bovenstaande symptomen.'

Testen bij asymptomatische personen

In de komende situaties is testen middels pcr te overwegen bij asymptomatische personen.

Voor/aan begin quarantaine bij:

- **Hoog-risico contacten (close contacts) van een bewezen patient die mogelijk de bron zijn van infectie**
Rationale: indien een contact de bron blijkt, kan rondom deze person ook contactonderzoek gestart.
Richtlijnen: dit is geen standaard advies en gaat verder dan ECDC/WHO/RIVM richtlijnen 'contactonderzoek'*.
- **Reizigers komende vanuit hoog-risicogebieden zoals de Verenigde Staten**
Rationale: bij testen voor vertrek kan een reiziger tegen gehouden worden; bij testen aan begin van de quarantaine kan een positieve test aanleiding geven tot contactonderzoek tijdens reis.
Richtlijnen: te overwegen advies vanuit OMT 3

Aan einde van quarantaine bij:

- **Hoog-risico contacten van een bewezen patient**

Rationale: Hiermee wordt voorkomen dat asymptomatische dragers het virus alsnog na hun quarantaine kunnen verspreiden.

Richtlijnen: dit is in overeenstemming met WHO richtlijn 'considerations for quarantine...', maar staat niet genoemd in WHO richtlijn 'contact tracing in the ...'.

- **Reizigers komende vanuit hoog-risicogebieden zoals de Verenigde Staten**

Rationale: Hiermee wordt voorkomen dat asymptomatische dragers het virus alsnog na hun quarantaine kunnen verspreiden.

Richtlijnen: dit is geen standard advies.

Info voor discussie: Op dit moment doen alleen Curacao en Saba dit. Curacao vindt een positivity rate vanbij asymptomaten aan einde quarantine. De rol van asymptomaten bij transmissie lijkt lag, maar is zeker niet uitgesloten. Daarnaast, een positive pcr betekent niet automatisch dat er vital virus aanwezig is.

Discussie: de franse optie.

Op dag 8 van de quarantine bij:

- Reizigers vanuit gebieden met laag risico covid circulatie.

Rationale: de franse collega's voeren dit in op de overzeese territoria. Bij een negatieve test op dag 8 kan de resterende periode van quarantine minder strikt worden: met mondkapje en hygiene maatregelen kan het huis verlaten worden.

*Geraadpleegde Richtlijnen:

<https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco>

<https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19>

<https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management>

[https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19))