

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Tue 6/16/2020 1:13:31 PM
Subject: RE: SARS-CoV-2 infecties in huishoudens
Received: Tue 6/16/2020 1:13:31 PM

Hoi (10)(2e)

Dank je, ik blijf graag op de hoogte.

Groet (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 16:59

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: SARS-CoV-2 infecties in huishoudens

Hoi (10)(2e)

Een heel goed punt, waar we binnen de FFX studie nog goed naar moeten kijken. Op dit moment heb ik dat nog niet goed in beeld. Er zijn zeker wel gezinnen, waarbij een persoon positief is getest en meerdere gezinsleden pas in de weken daarop klachten ontwikkelen en positief testen. Het is alleen moeilijk zeggen hoe dat loopt. Gaat transmissie van persoon 1 naar persoon 2 en van persoon 2 naar persoon 3? Of heeft persoon 1, zowel persoon 2 als persoon 3 geïnfecteerd?

We zijn op dit moment bezig om voor ieder gezin een tijdstip te maken waarin alles samenkomt. Alle uitslagen van de samples (neus/keel en feces PCR en serologie) en gerapporteerde klachten, om een beeld te vormen van hoe transmissie is verlopen. Ik kan je tzt wel een update geven over of we zien dat er verdenking is van transmissie via een secundair persoon.

Groeten,
 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 12:56

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: SARS-CoV-2 infecties in huishoudens

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Vanuit het LCI ben ik betrokken bij het protocol Bron en contactopsporing.

Op dit moment houden we aan dat bij een positieve test, de huisgenoten tot 14 dagen na de laatste risicoblootstelling aan de index, in quarantaine gaan.

Als er een secundaire infectie optreedt bij een huisgenoot, gaat de quarantaine periode opnieuw in voor de huisgenoten die contact hebben gehad met deze 2^e geïnfecteerde. Dit om verder doorgaande transmissie te voorkomen.

Vooral in gezinnen met kinderen, waar afstand houden praktisch soms niet uitvoerbaar is (zorg voor de kinderen), kan dit ertoe leiden dat het gezin wekenlang in quarantaine zou moeten.

Mijn vraag aan jullie: is er vanuit de FFX studie iets te zeggen over doorgaande transmissie in gezinnen? Theoretisch is het logisch dat een secundaire geïnfecteerd persoon weer anderen kan infecteren, maar gebeurt dat in de praktijk?

Hopelijk is mijn vraag zo duidelijk.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

T 030 (10)(2e)
M 06 (10)(2e)
(10)(2e) @rivm.nl
Werkdagen (10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
Postbus 1 (10)(2e) | 3720 BA Bilthoven
T (030 (10)(2e)