

**To:** (10)(2e) [ (10)(2e) @rivm.nl]  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Mon 10/26/2020 10:55:39 AM  
**Subject:** FW: Vraag afwijkende quarantaineperiode voor besmette cliënten  
**Received:** Mon 10/26/2020 10:55:40 AM

Hallo (10)(2e),

Vast een suffe vraag, maar ik weet het even niet. Zie geel gearceerde vraag (even los van het feit dat het hier om isolatie gaat en niet om quarantaine). Is dat een extra risicovermindering voor bewoners van instellingen voor LZ-zorg?

Hoor graag.

Met dank en groet,

(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@vgn.nl>  
**Sent:** vrijdag 23 oktober 2020 13:24  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@vgn.nl>  
**Subject:** Vraag afwijkende quarantaineperiode voor besmette cliënten

Beste (10)(2e),

Wij kregen de vraag waarom de quarantaine periode van besmette cliënten 14 dagen is na de start van de symptomen (zie onderstaand [schema op jullie website](#)), terwijl dit voor medewerkers maar 7 dagen is? Dit wordt als oneerlijk ervaren omdat veel cliënten niet extra kwetsbaar zijn voor een ernstig verloop van covid.

Kun jij aangeven waar dit onderscheid vandaan komt? Of zijn de inzichten intussen gewijzigd?

Daarbij is het verwarrend dat in de andere situaties een quarantaineperiode van 10 dagen moet worden aangehouden.

### Maatregelen naar aanleiding van een melding van een bevestigde patiënt

Alle met moleculaire laboratoriumtechnieken **bevestigde COVID-19-patiënten** moeten in isolatie blijven tot de periode beschreven in onderstaande tabel.

COVID-19-patiënt	Beschrijving	Advies opheffen isolatie
In het ziekenhuis	Patiënten en zorgmedewerkers met COVID-19 in ziekenhuizen	Zie het <a href="#">advies van FMS-expertisegroep infectiepreventie</a>
In overige instellingen, (verpleeghuis of gehandicaptenzorg)	Patiënt met bewezen COVID-19 niet opgenomen in ziekenhuis	Ten minste 24 uur symptomenvrij <sup>2</sup> EN 48 uur koortsvrij <sup>1</sup> EN minimaal 14 dagen na de start symptomen <sup>3</sup>
	Immuungecompromitteerde <sup>4</sup> patiënt met COVID-19 niet opgenomen in ziekenhuis	Ten minste 24 uur symptomenvrij <sup>2</sup> EN 48 uur koortsvrij <sup>1</sup> EN minimaal 14 dagen na de start symptomen <sup>3</sup> ; overweeg 2 keer testen met 24 uur ertussen
Binnen en buiten instellingen	Zorgmedewerkers met COVID-19	Ten minste 24 uur symptomenvrij <sup>2</sup> EN 48 uur koortsvrij <sup>1</sup> EN minimaal 7 dagen na de start symptomen <sup>3</sup> (indien immuungecompromitteerd <sup>4</sup> zie hierboven)
Buiten instellingen	Patiënt met COVID-19 in thuissituatie	Ten minste 24 uur symptomenvrij <sup>2</sup> EN minimaal 7 dagen na de start symptomen <sup>3</sup>
	Immuungecompromitteerde patiënt	Ten minste 24 uur symptomenvrij <sup>2</sup> EN minimaal 14 dagen na de start symptomen <sup>3</sup> ; overweeg 2 keer testen met 24 uur ertussen

Bijzondere situaties	Bij aanhoudende hoestklachten	Ten minste 24 uur sterk afgenomen hoestklachten EN 48 uur koortsvrij <sup>1</sup> EN minimaal 14 dagen na start symptomen <sup>2</sup> ; overweeg eenmalig testen
	Bij op het moment van afname asymptomatische personen	Minimaal 72 uur na afname van monster <sup>3</sup>

1. *Koortsvrij*: temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie.
2. *Symptoomvrij* van COVID-19: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.
3. *Start symptomen*: ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.
4. *Immuungecompromitteerd*: een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-celaantal < 200/mm<sup>3</sup>, zie verder onder het hoofdstuk [Risicogroepen](#) het punt over 'verminderde weerstand' onder het kopje 'Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten'.
5. Om uit te sluiten dat patiënt in de presymptomatische fase verkeert. Indien patiënt in de presymptomatische fase verkeert, z

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)



M: 06 – (10)(2e)

E: (10)(2e)@vgn.nl

werkdagen (10)(2e)

**Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland**

Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht  
Postbus 413, 3500 AK Utrecht