



Surveillance de la Covid 19

Guadeloupe: En Guadeloupe, les indicateurs de surveillance de la Covid-19 reflètent une stabilité de la situation épidémiologique de la Covid-19 ces deux semaines précédentes (du 14 au 27 décembre). Le taux d'incidence reste supérieur au seuil de vigilance de 10/100 000 hab. tandis que le taux de positivité est inférieur au seuil de vigilance de 5 %.

Saint-Martin: Une diminution de l'ensemble des indicateurs de surveillance épidémiologique a été observée la semaine dernière par rapport aux semaines précédentes. Le virus circule toujours de manière active à Saint-Martin.

Saint-Barthélemy: L'ensemble des indicateurs de surveillance épidémiologique montre une faible circulation du virus sur le territoire depuis deux semaines précédentes.

Martinique : Les indicateurs épidémiologiques du SARS-CoV2 en Martinique confirment, en cette semaine 52, la tendance relativement stable de l'épidémie et ce depuis 4 semaines. Le taux d'incidence était inférieur au seuil d'alerte et le taux de positivité inférieur au seuil de vigilance. Les incidences les plus élevées étaient enregistrées chez les personnes âgées de 15-44 ans et chez les 45-64 ans. Le nombre d'hospitalisations pour COVID était en diminution avec 20 personnes hospitalisées, en comparaison à la semaine précédente. A ce jour, 3 patients sont en service de réanimation.

Bonne réception,

Au-delà des circonstances sanitaires exceptionnelles et inédites, vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année.

L'équipe de Santé publique France Antilles

Si vous souhaitez que les points épidémiologiques soient diffusés à vos collaborateurs, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer leurs coordonnées par retour de mail.

Vous pouvez vous désinscrire de cette diffusion par simple retour de mail.



Direction des régions
Antilles
Tél. : 05 96 39 43 54
5.1.2e @santepubliquefrance.fr

>> Retrouvez-nous sur    

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :



Se laver les mains
très régulièrement



Tousser ou éternuer
dans son coude



Utiliser des mouchoirs
à usage unique



Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades



Porter un masque quand
on est malade