

To: [5.1.2e]; [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e]; [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e]
Cc: [5.1.2e]; [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e]; [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e @rivm.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 12/7/2020 7:34:32 AM
Subject: verzamelmail
Received: Mon 12/7/2020 7:34:34 AM
[20201205 parallele processen v1.pptx](#)
[vaccinstrategie \[5.1.2a\] NL.docx](#)

Hoi allemaal,

Wat verschillende vragen , groot en klein door elkaar, niet elke vraagt nú actie maar wel goed om dit met elkaar te bespreken en actiehouders te benoemen (toch [5.1.2e]). De eerste is wmb de belangrijkste.

1. Scherp krijgen van de aanpak van de parallele processen *(zie bijlage, dat beeld is nog onvolledig), wie doet wat en wat zijn de deadlines. Ook; vraagt dit aanpassing van interne structuur? Ook irt de ggd , si die voldoende aangesloten en hebben we de goede contacten over hun it, richtlijnen voor locaties, beveiliging etc?
2. maken logistieke plaat; hoe gaat dat er straks uit zien. Zou mooi zijn als we daar wat voor hebben ook voor de TB van woensdag. En mogelijk al de mcc van dinsdag.
3. Communicatie; kunnen we communiceren en vooral uitnodigen vóór richtlijn klaar is? onder voorbehoud van?

Kunnen we wettelijk vertegenwoordigers al om toestemming vragen zonder richtlijn?

Planning van stappen na registratie; wanneer en hoe lang nodig voor

1. Vervoer naar opslaglocatie
2. Maken van richtlijn
3. doelgroepadvies
4. eindejaarsbedankje/ bericht sturen naar alle betrokkenen. De sterkste troef – dat ben jij. Oid. Even overleggen wie dat oppakt
5. test logistieke keten; wordt er nagedacht over bv. een dry run, dan een eerste kleine run en dan opschalen?
6. Spillage; er gaan verschillende percentages rond (10 en 20%). Twee vragen; is 20% niet wat te hoog? En moeten we vor moderna een lager spillage aanhouden? We weten het natuurlijk nog niet wat het spillage zal zijn, maar vooraf incalculeren dat we 1 op de 5 vaccins weg moeten gooien vind ik wel ongelukkig.
7. Terugkoppeling gesprek met [5.1.2a] zie verslag in bijlage, kan mondeling nog wel iets toevoegen
8. NB ik had [5.1.2e] voorgesteld om onze team-dag (halve dag) te begeleiden, iemand nog een andere naam daarvoor?
9. Ws al bekend , maar zie hieronder nog een artikel over bijwerkingen pfizer

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
3720BA Bilthoven

5.1.2e

5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

5.1.2e

Pfizer meldt weinig bijwerkingen covid-vaccin, wel oppassen met sommige groepen

Nu Groot-Brittannië het eerste vaccin tegen covid heeft goedgekeurd, brengt fabrikant Pfizer ook meer informatie voor dokters en het grote publiek naar buiten. Uit de bijsluiter [valt op te maken](#) dat er maar weinig ernstige bijwerkingen te verwachten zijn, maar sommige groepen moeten wel oppassen, zoals mensen met koorts en vrouwen die zwanger zijn.

Deze documenten zijn opgesteld voor de Britse markt, maar ze zullen waarschijnlijk dezelfde informatie bevatten als die voor de EU, waar het middel nog op goedkeuring wacht. Nederland hoopt vanaf 4 januari hiervan ongeveer 900.000 doses te kunnen inzetten, allereerst om kwetsbare ouderen te beschermen.

In de bijsluiter van vijf kantjes voor het vaccin COVID-19 mRNA Vaccin BNT162b2 worden zeven symptomen gemeld die vaak voorkwamen bij de groep testpersonen: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, koorts, rillingen en pijn op de plek van de injectie.

In veel minder gevallen meldde men een zwelling of roodheid op de plek van de injectie en misselijkheid. Zeldzaam waren gevallen van algehele malaise en gezwollen lymfeklieren: ongeveer 1 procent van de proefpersonen maakte daar melding van, blijkt uit de bijsluiter.

Artsen wordt ook aangeraden om te letten op symptomen van een allergische reactie op het vaccin. Daarbij zou het kunnen gaan om kortademigheid, uitslag of zwelling van tong of gezicht.

Zwangerschap afgeraden

Uit de [handleiding voor artsen](#) blijkt dat het middel niet wordt aangeraden voor zwangere vrouwen. Ook wordt geadviseerd na een injectie twee maanden te wachten met een zwangerschap en geen borstvoeding te geven.

Zo'n advies is gebruikelijk bij veel medicijnen, simpelweg omdat er te weinig deelnemers in het onderzoek zaten die zwanger waren. Er is ook niet voldoende onderzoek gedaan naar de effecten op kinderen onder de 16.

Mensen die lijden aan een auto-immuunziekte als aids, last hebben van bloedingen of hoge koorts kunnen de prik beter ook niet krijgen. Een arts kan wel in individuele gevallen de beslissing nemen dat inenting toch het risico waard is.

Pfizer onderstreept dat de inentingscampagne op de voet gevolgd zal worden om andere bijwerkingen snel op te sporen. Aan artsen wordt gevraagd die snel door te geven als ze optreden.

Bevroren en ontdooid

Uit de artsenhandleiding blijkt verder dat het middel niet constant op minimaal 60 graden onder nul opgeslagen hoeft te worden. De Landelijke Huisartsenvereniging waarschuwde gisteren nog dat dat een [te complexe logistieke operatie](#) zou opleveren.

In de richtlijnen staat dat het ontdooide middel tot vijf dagen in de koelkast kan worden bewaard bij een temperatuur tot 8 graden. Op kamertemperatuur is het 2 uur houdbaar. De vloeistof die daarna nog niet is gebruikt, moet worden weggegooid.

Het middel moet in de originele verpakking worden bewaard om blootstelling aan zonlicht te voorkomen. Het wordt in vijf onverdunde doses per flesje ingevroren. Na ontdooiing dient de arts dat zelf te vermengen met een zoutoplossing.

Voor de vaccinatie zijn twee inentingen nodig, met 21 dagen ertussen. Op basis van het onderzoek gaat Pfizer ervan uit dat zeven dagen na de laatste injectie 95 procent van de mensen beschermd is tegen corona. Of dat percentage in de praktijk ook gehaald kan worden, moet blijken.