To: [redacted] .[[redacted] @minvws.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted] .
([redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl];
[redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl]; [redacted] ,
[redacted])[[redacted] @minvws.nl]
Cc: [redacted] .[[redacted] @minvws.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl]
From: [redacted])
Sent: Mon 11/16/2020 9:35:49 PM
Subject: RE: testen en BCO voor, tijdens en na vaccinatie
Received: Mon 11/16/2020 9:36:05 PM
image001.jpg

Ha allemaal,

Dit heb ik net gevraagd in de commissie vaccinaties van de GR. Volgens [redacted] geldt hier vooralsnog dat mensen sowieso niet gevaccineerd worden op het moment dat ze last hebben van flinke verhoging. Bij lichte klachten zou het wel kunnen schatten zij in (bij andere vaccinaties is dat ook zo), maar dat is echt nog onder voorbehoud van de eigenschappen van de vaccins. Daar hebben we pas bij toelating een volledig beeld van. Als er contra-indicaties zijn dan horen we dat dus nog.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] . < [redacted] @minvws.nl>
Verzonden: maandag 16 november 2020 11:59
Aan: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted])
< [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>;
[redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>
CC: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted] . < [redacted] @minvws.nl>; [redacted])
< [redacted] @minvws.nl>
Onderwerp: RE: testen en BCO voor, tijdens en na vaccinatie

Bij Q-koorts mocht dat niet maar dat is van een hele andere orde denk ik, ik had dit niet eerder gehoord maar ik hoor graag meer info
Voor zieke mensen denk ik dat in het algemeen geldt dat zij zich niet moeten laten vaccineren

Van: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>
Verzonden: maandag 16 november 2020 08:54
Aan: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted])
< [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted])
< [redacted] @minvws.nl>; [redacted] . < [redacted] @minvws.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>
CC: [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>; [redacted] . < [redacted] @minvws.nl>; [redacted])
< [redacted] @minvws.nl>
Onderwerp: RE: testen en BCO voor, tijdens en na vaccinatie

Ha, interessant verhaal van [redacted] . Er zitten wel veel aannames in mbt de startdatum van vaccineren. Maar dat doet hij waarschijnlijk vooral ter illustratie. Hij is in ieder geval flink optimistischer qua doorlooptijd dan RIVM ☺
Een ander aspect waar [redacted] het laatst over had lijkt me ikv de adviesvraag aan OMT ook relevant om mee te nemen; wat zijn evt contraindicaties om te vaccineren en in hoeverre kan testen daarbij behulpzaam zijn? Ik hoorde verhalen langskomen dat mensen die op moment x besmet zijn, niet op datzelfde moment x gevaccineerd kunnen worden (NB. ik weet niet of dit klopt, maar zo ja dan is het heel relevant om meer over te weten!). ook mede omdat mensen ook zonder klachten besmet kunnen zijn (asymptomatisch) of nog geen klachten kunnen hebben (presymptomatisch), is het dan de vraag in hoeverre testen voorafgaand aan vaccineren nog nodig/van meerwaarde kan zijn.

Groet, [redacted]

[redacted]

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

957010

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e