

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers instellingen voor jeugdzorg

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | Versie 15 april 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina)
 Terug naar [Algemene uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#)

Uitgangspunten:

- Indien het mogelijk is dat de zorgmedewerker thuisblijft of de werkzaamheden aanpast zodat er geen significant contact is met cliënten, dan dient de zorgmedewerker thuis te blijven tot 24 uur klachtenvrij of de werkzaamheden aan te passen.
- Prioriteit voor testen ligt bij de zorgmedewerkers die werken met lichamelijk kwetsbare personen.

Bij een **zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19** (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) eerst de volgende vraag doorlopen:

Kan de afstand tot de cliënt > 1,5 m bedragen of kan er sprake zijn van vluchtig contact*?

- Zo **ja**: pas algemene hygiënemaatregelen toe.
- Zo **nee**: medewerker **TESTEN**.^{**}

Totdat de testuitslag bekend is:

- Medewerkers met koorts: thuisblijven.
- Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)^{***} gebruiken zodat de medewerker de cliënt niet besmet.

Als testuitslag bekend is:

- Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
- Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

** Te denken valt aan eten of medicatie aanreiken. Ook in geval van een vluchtig contact kun je veilig werken zonder PBM. Zorg er dan voor dat je naast of achter de cliënt werkt.*

*** Neem contact op met de werkgever voor de procedure rondom testen. De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio (zie <https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19>).*

**** PBM om te voorkomen dat de medewerker met klachten het virus overdraagt aan cliënten, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende cliënten). De handschoenen moeten per cliënt gewisseld worden.*

NB Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de cliënt worden de standaard PBM gedragen. Zie <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>.

Versiebeheer

- 15-04-2020: De flowchart is verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde heeft.
- 10-04-2020: Eerste versie.