

**To:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl  
**From:** 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** Tue 1/12/2021 2:30:42 PM  
**Subject:** RE: Check antwoord bestuurder ziekenhuis  
**Received:** Tue 1/12/2021 2:30:43 PM

Akkoord.

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 15:02  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** Check antwoord bestuurder ziekenhuis

Hi 5.1.2e even check met jou:

Kan ik onderstaande als reactie sturen op de vraag van de bestuurder van het st jan zieknhuis?

Geachte 5.1.2e

De voorgestelde werkwijze wordt afgeraden door het RIVM.  
 De werkwijze zoals beschreven in de richtlijn Uitvoering COVID-19 vaccinatie is afgestemd met Pfizer. Andere verschillen in werkwijze die essentieel afwijken van of de bijsluiter of onze instructie zijn in principe niet toegestaan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e MSc,  
 5.1.2e Infectieziektebestrijding  
 Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

**From:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@sjgweert.nl>  
**Sent:** zaterdag 9 januari 2021 17:21  
**To:** 5.1.2h <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@sjgweert.nl>  
**Subject:** Vaccinaties 6 of 7 vaccins  
**Importance:** High

Beste 5.1.2e

Vandaag had ik telefonisch contact met u om te informeren naar de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen te kunnen vaccineren met het Pfizer vaccin. De ziekenhuizen zijn woensdag gestart en al snel werd duidelijk dat er in plaats van 5 zeker 6 vaccins uit een flacon konden. Tegelijkertijd ontstond de discussie of er een mogelijkheid was voor poolen. Twee halve overgebleven hoeveelheden uit twee flacons kunnen immers samen een nieuwe spuit vullen. Ziekenhuizen op enkele plekken in het land hebben dit ook gedaan. In mijn wekelijkse contact met de inspectie noemde hij dit aanvankelijk, maar in de avond hoorde ik van de inspecteur en vanuit de gevestigd apotheker vanuit de beroepsvereniging dat geconcludeerd werd dat dit toch niet mocht en mogelijk niet zorgvuldig werd geacht.

Echter nadenkend hierover riep dit iets anders op en daarover mijn vraag. Ik begrijp dat een naald van de ene naar de andere flacon potentieel risico's met zich mee kan brengen, maar wat nu als je met twee spuiten uit twee flacons het resterende vaccin optrekt en deze door het geven van twee injecties injecteert. Dan maken we wel optimaal gebruik van het vaccin en wordt het niet weggegooid, maar is er geen risico op een naald van de een in de andere flacon.

Dit vraagt dan wel een hele vlotte afstemming in het land, want anders wordt er 'teveel' weggegooid. Wat maakt het immers uit om twee maal een injectie te krijgen direct achter elkaar.

Ik hoop dat u spoedig het antwoord hebt en indien positief kan dit direct landelijk ingezet worden.

In afwachting,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, **MSc**

5.1.2e

RIVM – Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven  
Postbus 1 – 3720 BA Bilthoven

T: 5.1.2e

E: 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*