

## Verschillende type testen

Om te bepalen of iemand op dit moment COVID-19 heeft, kunnen verschillende testen ingezet worden. In de onderstaande tabel staat welke test je in welke situaties zou kunnen krijgen. Je kunt niet zelf kiezen voor een bepaalde test. Het kan zijn dat een type test (nog) niet beschikbaar is voor een doelgroep of in een regio. Waarschijnlijk kunnen de ademtest en antigeensneltest binnenkort ook in enkele hieronder genoemde situaties ingezet worden. Of ze voor die situaties geschikt zijn wordt nog onderzocht. De onderstaande tabel is een samenvatting van een OMT-advies van 30 december

Personen met recente klachten		
1	Ernstig zieke personen (kwetsbaar en niet-kwetsbaar) die zich melden bij de gezondheidszorg (bijvoorbeeld huisarts, SEH)	1) (LAMP-)PCR 2] Antigeensneltest – negatieve uitslag moet men bevestigen met (LAMP-)PCR
2	In instelling en kwetsbaar	1] (LAMP-)PCR 2] Antigeensneltest – negatieve uitslag moet men bevestigen met (LAMP-)PCR
3	Niet in instelling en kwetsbaar	(LAMP-)PCR of antigeensneltest  Een antigeensneltest is mogelijk bij kwetsbare personen met recente <i>milde</i> klachten zoals lichte verkoudheidsklachten.  <i>Mochten de klachten erger worden en de test was negatief, laat je dan opnieuw testen en zoek medische hulp indien nodig.</i>
4	Werkt met of is in contact met kwetsbare personen (zorgmedewerkers, mantelzorgers, bezoekers aan instellingen waar kwetsbare personen verblijven)	(LAMP-)PCR of (herhaalde) antigeensneltest of ademtest  Bij zorgmedewerkers dient een negatieve uitslag van de antigeensneltest bevestigd te worden met (LAMP-) PCR  <i>Mochten de klachten erger worden en de test was negatief, laat je dan opnieuw testen.</i>
5	Niet kwetsbare personen	(LAMP-)PCR of antigeensneltest of ademtest  <i>Mochten de klachten erger worden en de test was negatief, laat je dan opnieuw testen.</i>
Personen zonder klachten		
6	Met bekende blootstelling (i.h.v.k.v.bron en contactonderzoek & Coronamelder-notificatie)	(LAMP-)PCR
7	Screening in instellingen waar kwetsbare personen verblijven (i.h.k.v.uitbraakonderzoek)	(LAMP-)PCR of (herhaalde) antigeensneltest waarbij een negatieve antigeensneltest bevestigd wordt met (LAMP-)PCR
8	Screening in geval van andere clusters (i.h.k.v. uitbraakonderzoek in andere instellingen, scholen, werksituaties, etc)	(LAMP-)PCR of (herhaalde) antigeentest  <i>Mochten je klachten krijgen, laat je dan opnieuw testen.</i>
9	Terugkeer uit hoogrisicogebied	LAMP-PCR Na de quarantaineperiode kan een antigeensneltest ingezet worden. <i>Mocht je klachten krijgen, laat je dan opnieuw testen</i>

10	<p>Zonder bekende blootstelling</p> <p><i>Dit is nu niet van toepassing vanwege de strenge lockdown. Hiermee zal ervaring worden opgedaan zodra de aantallen besmettingen sterk zijn afgenomen.</i></p>	<p>Testkeuze afhankelijk van testdoel en wel/geen kwetsbare personen</p> <p>Antigeensneltesten zijn inzetbaar bij gezonde doelpopulaties, met kortdurende geldigheid (maximaal 48 uur) van een negatieve testuitslag voor het specifieke testdoel<sup>1</sup>.</p> <p><i>Mocht je klachten krijgen, laat je dan opnieuw testen</i></p>
----	---	--

<sup>1</sup> Bijvoorbeeld: een jonge, gezonde verpleegkundige 'mag' – zodra dat weer is toegestaan - wel met een fout-negatieve antigeensneltest naar een festival, maar dient dezelfde testuitslag niet te gebruiken om drie dagen later aan het werk te gaan, waar hij voor oudere, kwetsbare patiënten zorgt.