

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 1/26/2021 6:04:21 PM
Subject: FW: Aanpassing richtlijn aantal doses uit een flacon
Received: Tue 1/26/2021 6:04:21 PM

Stond op mijn boodschappenlijst voor de richtlijn , maar weet je al...*

Misschien ook voor de nieuwsbrief, samen met de nieuwe antistolling?

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: maandag 25 januari 2021 20:24
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: Aanpassing richtlijn aantal doses uit een flacon

Hoi [redacted],

Vandaag zijn twee mensen van de GGD langs geweest om te testen hoeveel doses AstraZeneca vaccin er op kan worden getrokken uit een flacon.

Dit blijken dus 12 doses te zijn en dan houd je nog ongeveer 0,2ml over. Er zit dus voldoende in.

Voor Moderna blijkt dat de huisartsen soms 11 doses uit een flacon kunnen krijgen.

Ziekenhuisapothekers krijgen met een speciale spuit en/of naald soms 7 doses uit een flacon Comirnaty.

In overleg met het CBG en de IGJ is daarom vandaag het volgende besloten. In de richtlijn mag bij alle drie de vaccins worden opgenomen dat "indien het lukt om een volledige <zevende> / <elfde> / <elfde of twaalfde> dosis van <0,3ml> of <0,5ml> uit de vaccinflacon op te trekken dan is dat akkoord".

Zou je dat willen toevoegen?

Daarnaast is besloten dat alleen ziekenhuisapothekers vloeistof van het Pfizer vaccin mogen samenvoegen (wat we eerst poolen noemde maar net niet helemaal hetzelfde is). Dit komt specifiek in de richtlijn/ werkinstructie van de ziekenhuisapothekers te staan en geldt alleen voor hun. De precieze werkwijze wordt daarin beschreven. Alleen deze beroepsgroep mag dit doen van IGJ omdat zij hiertoe bekwaam worden geacht en dit reeds voor andere bestaande (schaarse of dure) geneesmiddelen doen. Dit geldt dus niet voor bv. GGD'en, huisartsen of instellingsartsen. Daarnaast is nadrukkelijk vermeld dat ze niet vaccins mogen klaarleggen in een spuit en dan vervolgens buiten de eigen organisatie mogen verdelen (dit mag alleen van A naar B binnen de eigen etage). Dit hoeft niet in de LCI richtlijn opgenomen te worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

.....
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer [redacted] Postbak [redacted]
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030 [redacted]
 M 06- [redacted]
 F 030 [redacted]
 E [redacted]@rivm.nl

Werkdagen: [redacted]
