

Volgnummer: 29425

Onderwerp: COVID-19-vaccin

Aanmaakdatum: 20-01-2021

Casushouder:

Laatst gewijzigd: 20-01-2021

20-01-2021 -

Situatie:

Subject: wat te doen na ernstige bijwerking 1e prik?

Beste collega's

Er zijn enkele medewerkers geweest met een heftige reactie op 1e Pfizer vaccin.

Met name eerder doorgemaakte COVID lijkt hierin een rol te spelen. Deze medewerkers waren enkele dagen fors ziek met koorts, rillingen en spierpijn

Terecht vragen zij of het verstandig is om de 2e prik te halen.

Wat is jullie visie en onderbouwing daarvoor?

Ergens zegt mijn gevoel dat je deze vaccinatie als booster kunt beschouwen op de eerder doorgemaakte COVID. Met dat uitgangspunt zou je misschien kunnen zeggen niet voor de 2e prik te gaan.....

Ik hoor graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Human Resources, Arbo- & Milieudienst

5.1.2e @radboudumc.nl

5.1.2e

Overweging:

De richtlijn geeft aan dat ook na het doormaken van COVID het verstandig is om te vaccineren. Indien je heftig gereageerd op de eerste vaccinatie, dan is dat in principe geen contra indicatie (behalve anafylaxie), voor de vervolg vaccinatie. Of de eerste vaccinatie beschouwd mag worden als een boostering na infectie en of dat voldoende bescherming biedt voor de toekomst, daar is nog geen of te weinig data over. Wel is bekend dat een tweede vaccinatie meer en heftigere bijwerking kan geven en er lijkt ook een verband te zijn met hevigere reactie bij mensen die covid hebben doorgemaakt.

Antwoord:

Als antwoord bovenstaande overweging gegeven met daarbij het advies om dit goed met de betrokken medewerker te bespreken, zodat hij/zij een weloverwogen afweging kan maken of de voordelen van vaccineren opwegen tegen het nadeel van mogelijk heftigere bijwerkingen bij de tweede vaccinatie