

**To:** 5.1.2e [ 5.1.2e @nhg.org]  
**Cc:** 5.1.2e [ 5.1.2e @nhg.org]; 5.1.2e [ 5.1.2e @nhg.org]  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Tue 1/12/2021 12:57:55 PM  
**Subject:** RE: Thuisartstekst corona-vaccinatie: ter becommentariëring RIVM  
**Received:** Tue 1/12/2021 12:57:55 PM

Hallo 5.1.2e en anderen,

Nog een paar goede aanvullende punten van 5.1.2e van de LCI:

- Het RNA-vaccin is bij immuunsuppressie wel veilig. HIV/Aids zou ik hier niet noemen, is nou niet de meest voorkomende oorzaak van immuunsuppressie.
- Leeftijd: vaccins zijn goedgekeurd vanaf 16 jaar, keuze om in NL voor 18 te gaan staat daar los van. Kinderen zijn nu geen doelgroep omdat corona daar mild verloopt, 16/17 jarigen krijgen de prik voorlopig dus niet.
- Bloedverdunners: im vaccineren is niet altijd mogelijk, staat er nu beschreven alsof het nooit een probleem is.

5.1.2i

5.1.2i

- Koorts in de LCI-richtlijn is gedefinieerd als >38,5. Misschien goed dat ook te hanteren.

Verder heb ik nog uitgezocht: Over de anafylaxie zijn recente gegevens van CDC verschenen: 1/100.000 (of 11/miljoen) gevaccineerden. Dit is niet alleen een theoretische maar ook een praktische reden dat mensen echt min 15 minuten moeten blijven na de vaccinatie ter observatie en er een arts bij moet zijn die ervaring heeft met behandeling bij anafylaxie.

Groeten 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel