

Anafylactische reactie:
BEL 112 + toedienen medicatie:

1^e keus: Clemastine (1mg/1ml) i.m.
Volwassenen: Clemastine i.m. 2mg
Kinderen t/m 12 jaar: Clemastine i.m. 0,025mg/kg

2^e keus: Adrenaline: 1:1000 (1mg/ml) i.m.
Volwassenen: Adrenaline i.m. 0,5mg z.n.
Kinderen ≤ 5 jaar: i.m. 0,15 mg

EpiPen i.m. z.n.
Kinderen 6-12 jaar: i.m. 0,3 mg

1x herhalen na 5-15min indien de klachten niet zijn afgenomen
Kinderen 15-30 kg: i.m. EpiPen Junior
Kinderen > 30 kg: i.m. EpiPen

Vasovagale reactie

Wacht op herstel

Controleer vitale functies, bewustzijn en kenmerken van matige/ernstige reactie en handel naar gelang bevindingen

Epileptisch insult
Couperen als aanval > 5 min, status epilepticus:

Volwassenen:
Diazepam rectiole: 10mg/keer, bij onvoldoende werking 20mg/keer. Z.n. na 10 min herhalen

Kinderen > 3 jaar:
Diazepam rectiole: 10 mg/keer. Zo nodig na 10 min herhalen.

Kinderen 1-3 jaar
Diazepam rectiole: 5 mg/keer. Zo nodig na 10 min herhalen

Kinderen < 1 jaar:
Diazepam rectiole: 0,5 mg/kg lichaamsgewicht/keer. Zo nodig na 10 min herhalen

Bij uitsluitend urticaria:

Overweeg antihistaminicum:

1^e keus - Oraal:
Volwassenen: Levocetirizine 5mg
Kinderen t/m 5 jaar: Levocetirizine 2,5ml drank

2^e keus - Intramusculair:
Volwassenen: Clemastine i.m. 2mg
Kinderen t/m 12 jaar: Clemastine (1mg/1ml) i.m. 0,025mg/kg