

## Verkort protocol contra-indicaties

Zie voor volledige tekst en achtergronden: [COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

### Absolute contra-indicaties

Voor het stellen van een contra-indicatie voor een vaccinatie moet een individuele afweging gemaakt worden. Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties:

- een aangetoonde ernstige allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin;
- een aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin.

#### *Bestanddelen Moderna vaccin:*

- Lipid SM-102
- Cholesterol
- 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
- 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG)
- Tromethamol
- Tromethamol hydrochloride
- Acetic acid
- Sodium acetate trihydrate
- Sucrose
- Water for injections

### Relatieve contra-indicaties

#### **Koorts**

De temperatuur wordt gemeten voorafgaand aan de vaccinatie, bij  $T > 38,5$  wordt vaccinatie uitgesteld.

#### **COVID-19**

Na een positieve COVID test moet er een interval van 4 weken aangehouden worden tot aan vaccinatie.

Bij behandeling met monoklonale anti-COVID-19-antistoffen (alleen bij opname in ziekenhuis) moet een interval van 2-3 maanden aangehouden worden.

#### **Bloed- en plasmaproducten**

Het ontvangen van bloed- en plasmaproducten is geen contra-indicatie.

#### **Anesthesie**

Bij een geplande ingreep onder anaesthesie binnen 48u na de vaccinatie: de vaccinatie uitstellen tot na de ingreep.

#### **Epilepsie**

Bij personen die bekend zijn met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts, dient de behandelend arts een afweging te maken tussen de voor- en nadelen van de vaccinatie.

**Zwangerschap**

Bij zwangerschap vaccinatie uitstellen tot na de zwangerschap.

**Ernstige immuunstoornissen en hiv**

Ernstige immuunstoornissen en hiv zijn geen contra-indicaties.

**Okselklierverwijdering (noteren op lijst)**

Vaccineer in de andere arm.

**Verhoogde bloedingsneiging / stollingsstoornissen en antistollingsmedicatie (medicatie groep noteren op lijst!)**

Overleg met behandelend specialist bij:

- Aangeboren stollingsstoornis; hemofilie, Z van Von Willebrand
- Laag-moleculairgewichtsheparine, in therapeutische dosering
- Trombopathie of trombopenie (aantal  $<50 \times 10^9/l$ )
- DOAC + ander antistollingsmiddel

IM vaccinatie mag, mits 2 min stevig afdrukken bij (noteren op lijst):

- Coumarine derivaten (mits INR stabiel, of  $< 3,5$ )
- Laag-moleculairgewichtsheparine, in therapeutische dosering
- Trombocytenaggregatieremmers

Bij DOAC gebruik: het liefst vroeg in de ochtend prikken (tussen 8.00-10.00) vóór de medicatie inname of aan het einde van de dag (tussen 15.00-17.00) vóór de inname van het volgende tablet (ca 7 uur na de ochtend inname). Al dit niet kan, geldt: 10 min stevig afdrukken.

**Geen contra-indicaties zijn:**

- verkoudheid, lichte infectie van de bovenste luchtwegen, lichte maagdarminfecties, zonder koorts  $>38,5^{\circ}\text{C}$
- borstvoeding
- antibioticagebruik
- stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie
- chronische aandoeningen
- stofwisselingsstoornissen
- asplenie
- astma, eczeem, allergie (tenzij het een allergie betreft voor een bestanddeel van het vaccin)
- ondervoeding
- kippeneiwitallergie
- hartafwijkingen
- lokale en milde systemische (zoals zwelling, roodheid, verhoging) bijwerkingen na een vorige vaccinatie zijn geen contra-indicatie, tenzij het een zeer ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin betreft
- anafylactische reactie na een ander vaccin, medicijn of voedingsmiddel is geen contra-indicatie, maar wel een reden tot voorzorgsmaatregelen en een observatieperiode na de vaccinatie van 30 minuten