

**To:** 5.1.2e @middin.nl | 5.1.2e @middin.nl]  
**Cc:** 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Tue 1/12/2021 8:01:43 PM  
**Subject:** RE: Informatie e-mail  
**Received:** Tue 1/12/2021 8:01:44 PM

Beste 5.1.2e

5.1.2e heeft jouw vragen naar mij doorgestuurd en ik heb bij onze afdeling logistiek navraag gedaan. Hierbij het antwoord:

In de richtlijn staat (hfst. 5.2): *Eenmaal verdund mag het vaccin niet worden vervoerd (meegenomen worden op transport naar een andere locatie) en daarom moet de verdunding plaatsvinden op de vaccinatielocatie waar de deelnemers zullen worden gevaccineerd. Het mag binnen de vaccinatielocatie wel van plek A naar plek B gebracht worden.*

Als het vaccin opgelost is mag je het in de flacon nog 6 uur bewaren. Als je het optrekt in de spuit dan moet je het zo snel mogelijk gebruiken. Met de spuit lopen wordt afgeraden. Het opgeloste vaccin mag wel meegenomen worden in de flacon naar een ander gebouw (naald uit flacon!). Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de instabiliteit van het vaccin. Het vaccin moet daarom goed verpakt worden, zodat het zo min mogelijk schudt. We adviseren wel om zo min mogelijk te lopen. Bijvoorbeeld niet met het vaccin eerst nog langs allerlei andere cliënten lopen voordat je toedient. Rechtstreeks van locatie A naar locatie B.

Beantwoord dit je vragen? Zo niet, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

030 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid | A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA Bilthoven

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @middin.nl>  
**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 13:18  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** RE: Informatie e-mail

Beste 5.1.2e

We zijn volop aan de slag met het inrichten van twee priklocaties binnen Middin. Ik heb hierover nog een vraag die ons in de logistiek kan helpen.  
Het vaccin wordt op twee locaties geleverd. Op deze locaties zijn een klein aantal van onze huizen. Is het mogelijk om deze cliënten in huis te vaccineren? Het trekken van het vaccin wordt dan op de centrale plek gedaan, daarna is het 1 a 2 minuten lopen naar de woningen. Het zou voor de cliënten die hier verblijven, veelal laag niveau, rolstoelafhankelijk of met gedragsproblemen een groot voordeel hebben als dit mag. Ik hoor graag de (on)mogelijkheden. Voorop staat dat we anders hen toch naar de centrale ruimte halen, we verwachten echter dat we dan minder vaccins per uur kunnen zetten en de angst bij de cliënten groter wordt dan alleen die van de prik.

Een tweede vraag speelt bij ons op een locatie waar wij bijzondere zorg bieden, namelijk cliënten die aan de beademing liggen. Zij behoren zeker tot de hoog risico cliënten en we zouden hen graag in deze groep meenemen. Zij zitten echter niet zo dichtbij de centrale priklocatie. We onderzoeken of we hen liggend kunnen vervoeren. Is er een mogelijkheid alleen voor deze doelgroep een uitzondering te kunnen maken en de (al dan niet getrokken) vaccins naar hun toe te brengen. Gezien de afstand betekent dit vervoer per auto. Hiermee verschillen zij van de groep die hierboven beschreven is. Ik weet dat vervoer van het vaccin nu niet mag, maar wil graag weten of een uitzondering gemaakt kan worden en, indien dit het geval is, met wie wij hierover afstemming moeten hebben.

Alvast bedankt voor je tijd en aandacht.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

**Middin**

**Burgemeester Elsenlaan 170  
2288 BH Rijswijk**

**T 070** 5.1.2e

**M 06** 5.1.2e

**E** 5.1.2e [@middin.nl](mailto:5.1.2e@middin.nl)

**W** [www.middin.nl](http://www.middin.nl)



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel