

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl;
[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Wed 2/10/2021 11:04:47 PM
Subject: reactie op Moderna vaccin bij mensen die reeds Covid hebben doorgemaakt
Received: Wed 2/10/2021 11:04:49 PM
[2021.01.29.21250653v1.full-1.pdf](#)

Beste collega's,

In de besluitenlijst van jullie overleg over aanpassing van de richtlijn staat bij punt 95 al vermeld dat een tweede vaccinatie na doorgemaakte infectie misschien niet nodig is. Zie onderstaande vraag met bijgevoegd artikel. Ik heb al geantwoord dat het bij forse bijwerkingen na doorgemaakte Covid inderdaad te overwegen is om de tweede vaccinatie achterwege te laten. Is dit reden om het beleid nu aan te passen, cq dit ook expliciet op te nemen in de richtlijn ?

Groeten,

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@lhv.nl>
Sent: woensdag 10 februari 2021 08:51
To: [5.1.2e]@rivm.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@lhv.nl>
Subject: reactie op Moderna vaccin bij mensen die reeds Covid hebben doorgemaakt

Beste [5.1.2e]

Vanuit het veld krijg ik veel vragen over de Covid-19 vaccinatie bij mensen die reeds Covid hebben doorgemaakt. De reactie op het Moderna vaccin is beduidend heviger dan bij de anderen lijkt zo, op basis van signalen (vaccineren van de huisartsen).

De vraag is of deze mensen wel een tweede vaccin nodig hebben. Tevens of zij bij een tweede vaccin mogelijk dezelfde bijwerkingen verwachten.

Leeft deze vraag ook binnen het RIVM en wie kan ons daar goed over adviseren.

We zitten vlak voor de tweede ronde om de huisartsen te vaccineren.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

06- [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@lhv.nl>
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 22:40
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@lhv.nl>
Onderwerp: 2021.01.29.21250653v1.full-1.pdf

Verstuurd vanaf mijn iPhone