

Datum publicatie: 8-2-2021

Wekelijkse update bijwerkingen coronavaccins

Deze update betreft alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen bij coronavaccins en die door deskundigen bekeken zijn tot en met 7 februari 2021.

De meldingen gaan over ongeveer 500.000 gegeven vaccins.

Aantal meldingen

In totaal betreft het nu 2812 meldingen met 12.670 vermoede bijwerkingen. Waarvan 2661 meldingen na Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech) en 113 meldingen bij het vaccin van Moderna. In 38 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

Klik hier voor het overzicht van alle gemelde bijwerkingen. <link:
<https://www.lareb.nl/pages/wekelijkse-update-bijwerkingen>>

Vooral bekende bijwerkingen gemeld

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn (1476), hoofdpijn (1356) en reacties op de prikplek, zoals pijn (1284), zwelling (500) en warmte (443). Ook klachten zoals vermoeidheid (1204), je niet lekker voelen (1170), rillingen (756), misselijkheid (576x) en koorts (514) zijn vaak gemeld. Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren in het lichaam de afweer tegen het coronavirus. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en gaan ze na een paar dagen over.

Gemelde overlijdens

Tot nu toe zijn er 15 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. Het betreft 13 kwetsbare ouderen van 85 jaar en ouder en 2 ouderen tussen de 70 tot 84 jaar met ook een kwetsbare gezondheid. Zij zijn overleden binnen één tot negen dagen na de vaccinatie. Allen hadden meerdere en/of ernstige gezondheidsproblemen. Deze onderliggende gezondheidsproblemen zijn de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden.

Ongeveer de helft van hen kreeg in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand.

In Nederland overlijden per week gemiddeld zo'n 750-800 verpleeghuisbewoners. Hier zullen ook mensen bij zijn die pas geleden zijn gevaccineerd. Er overlijden ook ongeveer 200 verpleeghuisbewoners per week aan corona. Voor degenen met de grootste kwetsbaarheid of een korte levensverwachting is het raadzaam om een zorgvuldige afweging te maken voor vaccinatie.

Naar aanleiding van de gemelde overlijdens uit andere landen, waaronder Noorwegen, heeft de EMA (op 29-1) na het bekijken van die meldingen laten weten dat er geen veiligheidsrisico is gevonden. Bij deze meldingen ging het ook veelal om personen ouder dan 65 jaar, waarbij verergering van (meerdere) reeds bestaande ziekten een waarschijnlijke verklaring voor overlijden lijkt. Sommige personen waren al in het eindstadium van een ernstige ziekte vóór de vaccinatie.

Allergische reacties

Bij 25 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie bij het vaccin van Pfizer/BioNTech. Bij 8 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de 17 andere

meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag en zwelling rond de ogen of keel) die bij een anafylactische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van heftige allergische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld. Heftige allergische reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te sluiten. De richtlijn voor COVID 19 vaccinatie geeft aan dat na een heftige allergische reactie binnen 4 uren na vaccinatie de 2^e vaccinatie niet gegeven mag worden. <<https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4-contra-indicaties-en-aandoeningen-die-aandacht-vragen-bij-alle-covid-19-vaccins>>

Epilepsie

Bij mensen met epilepsie kan een vaccinatie of koorts na een vaccinatie een epileptische aanval uitlokken. Dit kan bij alle vaccins gebeuren. Lees [hier](#) meer over algemene informatie over vaccins en epilepsie. < link: <https://www.lareb.nl/vaccin-knowledge-screen?id=1481&page=1&searchArray=epilepsie&name=Epilepsie%20en%20vaccinatie>

Bij de coronavaccins zijn tot nu 14 meldingen met een epileptische aanval gedaan. Er is geen reden om mensen met epilepsie niet te vaccineren. De [richtlijn voor COVID-19 vaccinatie](#) geeft aan dat mensen die vaker een epileptische aanval hebben gekregen na een vaccinatie of na koorts, samen met de arts overwegen wat het beste is om te doen. <link: <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4-contra-indicaties-en-aandoeningen-die-aandacht-vragen-bij-alle-covid-19-vaccins>>

Uitgebreide zwelling van de gevaccineerde arm

Na vaccinatie kan zwelling en/of roodheid op de injectieplaats ontstaan als gevolg van een plaatselijke ontstekingsreactie. Deze zwelling kan soms zeer uitgebreid zijn en zelfs tot over de schouder of de elleboog heen gaan. Er is meestal geen sprake van een infectie of een allergische reactie en behandeling is niet nodig. Koelen kan de pijn en zwelling verzachten. Er zijn 50 meldingen van zo'n uitgebreide zwelling na coronavaccinatie. Het verdwijnt vanzelf binnen 4 tot 5 dagen zonder blijvende klachten. Zie [hier](#) voor meer informatie over deze bijwerking.

<https://www.lareb.nl/vaccin-knowledge-screen?id=1472&page=1&searchArray=els&isSinglePageResult=true&name=Uitgebreide%20zwelling%20van%20een%20gevaccineerde%20arm%20of%20been%20na%20vaccinatie>

Overige meldingen

In het overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen staan ook klachten die niet in de bijsluiter staan. Deze en ook andere opvallende meldingen worden binnen Lareb besproken in een overleg met experts. Als de meldingen daar aanleiding toe geven kan een nadere analyse gedaan worden. Zo kunnen eventuele nieuwe bijwerkingen opgespoord worden. Tot nu toe is dat niet zo. Het blijft belangrijk dat mensen vermoede bijwerkingen melden. Zodra de meldingen wel tot nieuwe inzichten leiden, zullen we dat bekend maken.