




Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Mutation of SARS-CoV-2: current variants of concern

8 February 2021

Mutations of SARS-CoV-2 that cause COVID-19 have been observed globally. Viruses, in particular RNA viruses such as coronaviruses, constantly evolve through mutations, and while most will not have a significant impact, some mutations may provide the virus with a selective advantage such as increased transmissibility.

Such mutations are cause for concern and need to be monitored closely.



#COVID19

Learn more in the latest risk assessment by ECDC on SARS-CoV-2 variants of concern <http://bit.ly/RRAvariants1>



SARS-CoV2 Varianten

Consequenties voor
Nederlandse overzeese
Rijksdelen


5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

SARS-CoV2 varianten 18-2-2021

Epidemiologie 4 landen



	Populatie	Ongeregistreerde inwoners (schatting)	Inw. Totaal aantal 31-1	Aantal 7-2	Aantal 14-2	Patiënten laatste week	Patiënten laatste 2 weken	incidentie /100.000/week	Incidentie totaal inwoners /100.000/week
Curacao	164.100	15.000	179.100	4585	4613	4650	37	22,5	20,7
Aruba	106.800	15.000	121.800	6966	7223	7413	190	177,9	156,0
Sint Maarten	44.000	15.000	59.000	1862	1936	1998	62	136	140,9
Bonaire	20.900	1.000	21.900	366	368	378	10	47,8	45,7




Biologie eiwitconstructie




- DNA, RNA, 4 nucleotiden (CTGA; Cytosine, Thymine, Guanine, Adenine))
- Triplets (codon) coderen voor 20 aminozuren die eiwitten vorm geven met ieder specifieke eigenschappen
- Genen, nummering nucleotiden
- Foutjes in copieren: mutaties

Bekende mutaties bij Sars-CoV-2:


- **N501Y** (Asparagine op 501 → Tyrosine)
 - Gevolg: R_t hoger, virus besmettelijker
- **E484K** (Glutaminezuur op 484 → Lysine)
 - Gevolg: antistoffen na natuurlijke infectie of vaccinatie minder effectief



Summary of protein synthesis



De Varianten of Concern (VOC)




Variant	Wetenschappelijke naam	Rt	Reactie vaccin	Ernst beloop	Waar?	Mutaties
Britse variant	B.1.1.7	>, 1,4 x	=	>	VK, West-Europa	P681H, N501Y, 69-70del,(E484K)
Zuid Afrikaanse variant	B.1.351	>	<	?	Zuid Afrika	K417N, E484K, N501Y
Braziliaans P1 (Manaus)	B.1.1.28 P1	>	<	?	Amazonas, Manaus	12, K417T, E484K, N501Y
Braziliaans P2	B.1.1.28 P2	>	<	?	Brazilië	4, E484K
Californie variant	B.1.429	>?	?	?	VS	L452R

B.1.1.7 in VK en Ierland



Ireland's Covid-19 cases surge

The country recorded the world's highest infection rate last week, driven by the presence of the more transmissible UK variant along with household mixing over the holidays.



Ierland – level 5 (4,9x10⁶ inw.)


meer dan 50% VOC202012/01

ziekenhuisbed 2.020 (- 7132 NL)

IC-bed 221 (- 900 NL)

- blijf thuis, géén bezoek indien buiten radius 5 km
- alleenwonenden 'support bubble'
- thuiswerken tenzij essentieel beroep
- scholen gesloten, contactberoepen gesloten
- winkels muv voedsel gesloten, musea gesloten
- bouw stilgelegd, tenzij ..
- huwelijk max 6; begrafenis max 10
- kerkdiensten alleen on-line
- sportscholen gesloten

5



Titel | Date_Text

B.1.1.7 in Nederland




Uit analyse Nederlandse data:


- verdubbelingstijd van 6.8 dagen
- op 12 februari 67% van EZD UK variant

Rt Getal (obv 29 januari)

- samen: 0.96 (0.93 - 0.99)
- VOC: 1.15 (1.09 – 1.21)
- wildtype: 0.86 (0.78 – 0.92)




Inschatting toename VOC-202012/01 in Nederland



Modellering ziekenhuisopnamen



Bezette ziekenhuisbedden met COVID-19



Belangrijk:

- dit is met vaccinatie
- dit is mét immuniteit na infectie

Onzekerheid over de precieze hoogte blijft

- hangt af van toename in Rt
- onzekere inschatting van effect strengere lockdown

B.1.1.7 in Nederland



- Grote onzekerheid – brede onzekerheidsmarges rondom median
- Risico op hoge zorgpiek a.g.v. UK-variant blijft hoog zonder strenge lockdown, *ondanks* vaccinatie
- Toch: flinke reductie a.g.v. vaccinatie, *mits* transmissie voorkomen wordt dus versnellen van aanlevering vaccins mogelijk groot effect
- Huidige maatregelen inclusief vaccinatie lijken een hoge derde golf te voorkomen,
echter
 - bij langdurig effectieve avondklok en 1 bezoeker per huishouden
 - beperkte toename bij openen primair onderwijs en kinderopvang

veel onzekerheid (ook vanwege vele variant Corona virussen)

moet nog aan model gesleuteld worden

B.1.1.7 in Caribische Regio



Britse variant aangetoond op Aruba (14) en Curacao (1)

Reden voor zorg en maatregelen:

1. Opzetten (kiem) surveillance
2. Reisbeleid aanpassen aan epidemiologie
 1. Alleen essentiële reizen tussen eilanden
 2. Testen voor / na aankomst
 3. Quarantaine en testen
 4. Complexe discussie rondom toerisme, maximaal veilig inrichten
3. Strengere maatregelen zijn nodig bij verheffingen
4. Hoge compliance voor vaccinatieprogramma noodzakelijk
5. Aandacht voor ongedocumenteerden