

Handreiking tegengaan spillage COVID-19-vaccins huisartsenzorg

- Aanleiding handreiking: schaarste, multidosesflacons, voorkomen spillage
- Uniform aan handreiking voor de andere uitvoerders
- Doel: om te bepalen aan wie overgebleven vaccins toegediend kunnen worden ter voorkoming van spillage
- LCI-richtlijn: *'Enige spillage aan het eind van de dag zal altijd optreden. Dit vaccin, wat anders zou worden weggegooid, kan aangeboden worden aan de professionals die het vaccin toedienen'*.

Voorstel prioritering

(Uitgaande dat HA-personeel dat vaccins toedient al gevaccineerd is)

1. Mensen uit de eerstvolgende doelgroep (beginnend bij de oudsten)
2. Voor gezondheidscentra en grotere praktijken overige medewerkers:
 - Die nauw betrokken zijn bij vaccinatietoediening
 - die in dagelijks werk direct nauw contact met personen hebben (bv andere zorgverleners)
 - die anderzijds werkzaam zijn in het gebouw (bv administratie, schoonmaak).
3. Overige patiënten(groepen) denkende aan:
 - Overige medewerkers in instellingen die onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen (bv andere zorgverleners, begeleiders, nachtzorg, schoonmaakpersoneel).
 - Overige aanbevolen groepen die vallen onder de patiëntengroep van de huisarts
 - Evt familieleden van de huisarts(en)

Houdbaarheid	Temperatuur		
	BP: -90 tot -60°C Mo: -25 tot -15°C	Allen: 2 tot 8°C	BP: 8 tot 30°C Mo/AZ: 8 tot 20°C
Vaccinflacon onaangebrouwen	BP: 7 mnd Mo: 7 mnd AZ: n.v.t.	BP: Tot de "te gebruiken datum en tijd" Mo: Tot de "te gebruiken datum en tijd" (30 dg na verwijdering uit vriezer) AZ: 6 mnd	BP: 2 uur (na verwijdering uit koelkast Mo: 12 uur (na verwijdering uit koelkast AZ: 6 uur (na verwijdering uit koelkast
Opgelost vaccin in vaccinflacon	BP: n.v.t. Mo: n.v.t. AZ: n.v.t.	BP: 6 uur na toevoegen oplosvloeistof Mo: z.s.m. (< 6 uur) AZ: z.s.m. (< 6 uur)	BP: 6 uur na toevoegen oplosvloeistof Mo: z.s.m. (< 6 uur) AZ: z.s.m. (< 6 uur)
Vaccin opgetrokken in spuit	BP: n.v.t. Mo: n.v.t. AZ: n.v.t.	BP: z.s.m. (< 6 uur) Mo: direct gebruiken AZ: direct gebruiken	BP: z.s.m. (< 6 uur) Mo: direct gebruiken AZ: direct gebruiken
Aantal doses per flacon	BP: 7 doses Mo: 11 doses AZ: 10 of 8 doses (afh van de hoeveelheid ml per flacon)		
Streefinterval tussen twee doses	BP: 21 dagen (3 weken) Mo: 28 dagen (4 weken) AZ: 8 - 12 weken (nog niet bekend voor NL)		

Oplossende
maatregelen voor
spillage en
prioritering is
vaccinafhankelijk

Vragen aan jullie

- Eens met groepen in de prioritering?
- Zijn er aanvullende groepen die ontbreken?

Uitzonderingssituaties vaccinaties en voorstel

- Beschrijving van uitzonderingssituaties, oplossingsmaatregelen en vervolgstappen
 - Scenario's opgesteld voor 1ste prik (volgt nog)
 - Scenario's opgesteld voor 2de prik: vlg dia
 - Verpleeghuizen & gehandicaptenzorg
 - GGD
 - Acute zorg
 - HA: 60+ & 60-met medische indicatie
 - BES & CAS

Uitzonderingssituaties tweede prik HA

Geïdentificeerde uitzondering	Opgelost?	Oplossende maatregel(en)	Vervolgacties
1. Verhuizing	DEELS	<ul style="list-style-type: none"> Contact opnemen met huisarts die 1^e prik heeft toegediend 	<ul style="list-style-type: none"> [U] @ 5.1.2e : QA voor burgers – pas na huisartsen WG. [QA Bureaukaart huisartsteam]
2. Verhuizing naar instelling na 1 ^e prik, dus 2 ^e prik op andere locatie bv. verpleeghuis	DEELS	<ul style="list-style-type: none"> Verantwoordelijkheid voor huisarts die 1^e prik heeft toegediend, afstemmen met verpleeghuis + mantelzorg 	<ul style="list-style-type: none"> [U] @ 5.1.2e QA voor burgers; QA uitvoerende partij (SNPG/NHG) pas na huisartsen WG. [QA Bureaukaart huisartsteam]
3. Brief/herinnering gekregen, maar vergeten/verloren of niet gelezen	DEELS	<ul style="list-style-type: none"> Contact opnemen met huisarts die 1^e prik heeft toegediend 	<ul style="list-style-type: none"> [U] @ 5.1.2e QA voor burgers – pas na huisartsen WG. [QA Bureaukaart huisartsteam]
4. Afwezigheid (vakantie, ziekte, ander logeeradres)	DEELS	<ul style="list-style-type: none"> Contact opnemen met huisarts die 1^e prik heeft toegediend 	<ul style="list-style-type: none"> @Toetsen in werkgroep: uitzoeken of er SMS/brief/mijnoverheid alerts worden verstuurd als herinnering en als no-show
5. Klachten passend bij COVID of in quarantaine en kan niet gevaccineerd worden	JA	<ul style="list-style-type: none"> Contactopnemen met huisarts. 	<ul style="list-style-type: none"> Staat momenteel in de QA
6. 1 ^e prik is toegediend, 2 ^e prik nu mogelijke contra-indicatie	DEELS	<ul style="list-style-type: none"> Specifieke situatie – afhankelijk van individu probleem. Overleg met huisarts. 	<ul style="list-style-type: none"> [U] @ 5.1.2e : QA voor burgers – pas na huisartsen WG. [QA Bureaukaart huisartsteam]
7. Geen vaccins meer beschikbaar, annulering	NEE	Indien dit voordoet: RIVM/huisartsoverleg ¹	
8. 2 ^e prik toediening met ander vaccin	NEE	Indien gebeurd: individuele oplossing via medisch professional. Intentioneel: moet voorkomen worden/moet niet gebeuren ¹ .	

Vragen aan jullie

- Missen er belangrijke uitzonderingen in de lijst?
- Sturen reminder-sms voor 2de prik in de praktijk?
- Eens met de oplossende maatregelen?
- Eens met de oplosvervolgacties
 - Opnemen in Q&A voor burgers
 - Opnemen onderdeel “proces” bureaukaart