

Vaccinatie medische risicogroepen en thuiswonende, niet mobiele ouderen

1. Vaccinatie medische risicogroepen

Hoog risicogroepen

De Gezondheidsraad heeft in het advies van 4 februari jl. zeven patiëntengroepen benoemd die op basis van hun medische achtergrond, sneller in aanmerking zouden moeten komen voor een COVID-19 vaccinatie.

Groep 1 via de medisch specialist met een mRNA-vaccin:

- Patiëntengroepen met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem, zoals:
 - Patiënten met hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar;
 - Patiënten met ernstig nierfalen of dialyse;
 - Patiënten na orgaan- of stamcel of beenmergtransplantatie;
 - Patiënten met een primaire immuundeficiëntie;
- **EN** Patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is (zoals ALS-patiënten en patiënten met Duchenne).

Het risico voor deze groep is gelijk aan de groep 70-80 jarigen. Er wordt gestreefd naar een **start in week 9** voor deze groep.

Groep 2 via de huisarts:

- De mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas (BMI>40) krijgen het vaccin van AstraZeneca bij de huisarts.
- De huisarts morbide obesitas mensen op om zelf hun BMI uit te rekenen en met hun eigen huisarts te bespreken of zij op dit moment in aanmerking komen voor vaccinatie.
- Met deze groepen is regionaal gestart.

Andere groepen met een medische indicatie

De Gezondheidsraad adviseert andere mensen met een medische indicatie (zoals vastgesteld in het advies van 19 november jl.) gelijktijdig met de 50-59 jarigen te vaccineren, omdat zij ongeveer eenzelfde risico hebben op een ernstig beloop en sterfte van COVID-19. Het gaat om de volgende groepen:

- Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
- Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie;
- Patiënten met diabetes mellitus;
- Patiënten met chronische nierinsufficiëntie (dialyse en niertransplantatie-patiënten);
- Patiënten met een afweerstoornis of behandeld met immuunsuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties;

Afspraken:

- Overleg met de huisartsen over de uitvoering van vaccinatie van de groep mensen met een medische indicatie (ongeveer 1.000.000 mensen).
- Gestart met deze groep nadat de groep 60 tot en met 64-jarigen is afgerond en er voldoende vaccin beschikbaar is.
- Deze groep omvat de mensen die normaliter voor de griepvaccinatie worden uitgenodigd en sluit daarom heel goed aan bij de uitvoeringspraktijk van de huisartsen, zoals zij dit jaarlijks voor de griepvaccinatie uitvoeren.
- Wanneer deze groepen kunnen starten is afhankelijk van de leveringen. Op basis van de nu beschikbare informatie is de verwachting in mei te kunnen starten met het uitnodigen van deze groep.

2. Vaccinatie van thuiswonende niet mobiele 65-plussers

Mensen die niet naar zelfstandig of met hulp naar de GGD kunnen. Gekeken wordt of zij hun vaccinatie van de huisarts kunnen ontvangen. Zij worden met een mRNA vaccin gevaccineerd.