

Hygiënische maatregelen in hete kader van bescherming tegen infectie met Sars-COVID-19 bij noodzakelijke verrichtingen op tbc-afdelingen en contactonderzoek op locatie

Pre ambule

Deze adviezen zijn opgesteld conform de [Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis](#) van het RIVM Versie 24 maart 2020 en getoetst bij het RIVM en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd.

Algemeen

- Geef op de website van de afdeling TBC-bestrijding **informatie over welke onderzoeken nog plaatsvinden** en welke zijn uitgesteld.
- Zorg voor **spreiding van de afspraken** van patiënten op het spreekuur zodat opeenhoping van groepen personen wordt vermeden.
- Zorg dat in de wachtkamer de cliënten 1.5 meter uit elkaar kunnen zitten.
- Vraag cliënten de **gezondheidsvragenlijst al voor hun komst** of in de wachtkamer in te vullen zodra ze zich melden.
- Probeer bij **cliënten met klachten tevoren triage** te laten plaatsvinden in hoeverre de klachten TB-gerelateerd of corona gerelateerd kunnen zijn. Laat triage zoveel mogelijk door de artsen of verpleegkundigen uitvoeren en de arts het beleid bepalen.
 - Bij telefonisch contact met de cliënt belt de arts of verpleegkundige terug of wordt de cliënt met hen doorverbonden.
 - Bij cliënten met klachten aan de balie zie punt A1.
- Hang posters op in de wachtkamer en functieruimten met hygiëne instructies om verspreiding corona te voorkomen.
- Raadpleeg de hygiëne adviseur / hygiëne inspectie afdeling van uw GGD over het gebruik van [geschikte middelen voor handdesinfectie en de reiniging van oppervlakten](#).

A. Onderzoek bij de afdeling tbc-bestrijding van de GGD

1. Baliefunctie en aanmelden cliënt:

- Zorg dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen cliënt en medewerker, of maak gebruik van een loket dat met behulp van plexiglas of iets dergelijks gesloten kan worden waarbij geluidsoverdracht nog wel mogelijk is. Maak een lijn voor de balie indien noodzakelijk.
- Neem geen IND papieren en ID kaart aan. Laat ze de papieren in een bak leggen. Laat de cliënten hun ID kaart tonen..
- De baliemedewerker vraagt bij iedere cliënt naar hoestklachten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn en/of koorts. Check de gezondheidsvragenlijst.
- Bij twijfel over te nemen maatregel raadpleeg de arts of verpleegkundige.
- Bij klachten (niezen, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten) krijgt de cliënt al bij de balie een mondmasker uitgereikt alvorens verdere onderzoeken te starten.
 - Bij neusverkoudheid of niezen kan een chirurgisch masker volstaan,
 - Bij hoesten blijft een FFP2 masker geïndiceerd.
 - Volg bij hoestende cliënten het al bestaande beleid verdenking TB (zet de cliënt apart en schakel de arts of verpleegkundige in).

2. Na 1^e triage aan de balie afdeling tbc-bestrijding:

Algemeen

Zorg dat maar één client gelijk naar binnen komt in de functieruimten. Uitzondering zijn kinderen waarbij één van de ouders aanwezig moet zijn.

Houdt in de spreek- / behandelkamer ook een afstand van 1,5 meter aan als er geen verrichtingen plaatsvinden.

Zorg voor een opstelling van de stoelen in alle ruimtes die dit mogelijk maakt.

Verrichtingen

1. THT zetten en aflezen:

Ga niet recht tegenover de cliënt zitten, maar laat de cliënt de linkerarm naar opzij uitsteken. Hiermee creëer je meer afstand en kijk je de cliënt niet in het gezicht. Zorg voor een opstelling van de stoelen die dit mogelijk maakt.

Instrueer de cliënt het hoofd af te wenden en niet naar de eigen arm of MTM' er te kijken.

Was je handen met water en zeep of desinfecteer na elk cliëntcontact zorgvuldig je handen..

Desinfecteer bij cliënten met klachten ook de stoel, deurkruk en eventuele andere oppervlakten die met de handen zijn aangeraakt met een daarvoor geschikt desinfecteermiddel.

2. Venapunctie:

Probeer zoveel mogelijk afstand tot de client te bewaren. Kijk je de cliënt niet in het gezicht. Zorg voor een opstelling van de stoelen die dit mogelijk maakt.

Instrueer de cliënt het hoofd af te wenden en niet naar de eigen arm of MTM' er te kijken.

Was je handen met water en zeep of desinfecteer na elk cliëntcontact zorgvuldig je handen..

Desinfecteer bij cliënten met klachten ook de stoel, deurkruk en eventuele andere oppervlakten die met de handen zijn aangeraakt. WEBSITE

3. Maken X-thorax:

Laat de cliënt zelf met de borst tegen de plaat plaatsnemen en houdt zelf zoveel als mogelijk afstand zonder dat de kwaliteit van de foto wordt beïnvloed.

Corrigeer de houding alleen door de cliënt van achteren te benaderen. Na het maken van de foto doe je een stap terug en laat de cliënt langslopen richting kleedkamer.

Was of desinfecteer na elk cliëntcontact zorgvuldig je handen. Maak na iedere cliënt de platen schoon En desinfecteer de kinsteun met een daarvoor geschikt middel. WEBSITE

Desinfecteer bij cliënten met klachten ook de stoel, deurkruk en eventuele andere oppervlakten die met de handen zijn aangeraakt.

B. Contactonderzoek op locatie

Bij de voorbereidingen om contactonderzoek op locatie uit te voeren worden de hygiënische maatregelen meegenomen zodat op de locatie het verantwoord is om volgens de geldende instructies het onderzoek ter plekke uit te voeren

1. Uitnodigingsbrief

Vraag cliënten *tevorens* de gezondheidsvragenlijst in te vullen.

Vraag cliënten met gezondheidsklachten telefonisch contact op te nemen met de GGD, zodat een telefonische triage kan worden gedaan en afspraken voor het vervolgtraject gemaakt kunnen worden.

2. Onderzoek op locatie

Algemeen

Zorg dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de te onderzoeken cliënten in de wachtrij of wachtruimte en met de medewerker tijdens het onderzoek.

De medewerker controleert bij elke cliënt of de vragenlijst is ingevuld en eventuele klachten zijn gesignaleerd.

Bij klachten (niezen, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten) krijgt de cliënt een mondmasker uitgereikt. Bij neusverkoudheid of niezen kan een chirurgisch masker volstaan, bij hoesten blijft een FFP2 masker geïndiceerd en wordt cliënt apart of als laatste geholpen. Er kan ook voor gekozen worden deze cliënten op de GGD-locatie te ontvangen.

3. Verrichtingen

THT zetten en aflezen:

Ga niet recht tegenover de cliënt zitten, maar laat de cliënt de linker arm naar opzij uitsteken. Hiermee creëer je meer afstand en kijk je de cliënt niet in het gezicht. Zorg voor een opstelling van de stoelen die dit mogelijk maakt.

Instrueer de cliënt het hoofd af te wenden en niet naar de eigen arm of MTM' er.

Desinfecteer of was **na elk cliëntcontact** zorgvuldig je handen (hiervoor dienen dus voorzieningen op locatie te zijn).