

## Toepassing mondneusmaskers ('mondkapjes')

### Algemeen advies

- Zuinig omgaan met mondkapjes
- Advies aan alle gezondheidszorginstellingen om gebruikte mondkapjes te bewaren voor toekomstig hergebruik.

### Gepast gebruik mondmaskers op basis van adviezen OMT, RIVM en WHO

#### *Advies over toepassing*

- Alleen bij nevelvormende procedures, bijvoorbeeld intubatie of sommige vormen van reanimatie, in de ziekenhuis- en langdurige zorg zijn maskers nodig,
- Bij alle andere vormen zorg wordt het gebruik van chirurgische mondkapjes geadviseerd.
- Geen mondkapjes gebruiken voor patiënten en bij contacten in de thuissituatie.

#### *Advies bij verlengd gebruik van een FFP-/chirurgische kapjes:*

- Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden tot ongeveer 3-4 uur of als het masker heel nat is.
- Maskers hoeven niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar.

### Inkoop en verdeling mondkapjes

- Voor de persoonlijke beschermingsmiddelen geldt dat aanvoer wordt samengebracht in een landelijke opslagruimte.
- De GGD-GHOR, in samenwerking met het ROAZ, is vervolgens verantwoordelijk voor de verdeling over de verschillende ROAZ-regio's.
- Er is een webapplicatie ontwikkeld, waarin op dit moment in elk geval ziekenhuizen, huisartsen, GGD'en en ambulances hun voorraad en behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen invullen.
- De verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en ggz-instellingen worden hier zo snel mogelijk op aangesloten. Zij kunnen nu telefonisch en per mail hun wensen kenbaar maken bij de regionale ROAZ-coördinator.
- Aan de hand daarvan maakt de GGD-GHOR een verdeling van centraal binnengekomen middelen.

#### *Acuut tekort*

- Zorgaanbieders kunnen contact opnemen met hun regionale ROAZ-coördinator, aan de hand van een contactpersonenlijst die recent is verspreid.
- Dat geldt ook voor zorgaanbieders die niet direct bij het ROAZ zijn aangesloten, zoals de VVT-sector, de GGZ en de gehandicaptenzorg.