



Werkinstructie Reanimatie bij (mogelijk) besmette personen

Versie 15-03-20

Algemeen

Het Coronavirus kan overgedragen worden door verspreiding van druppels uit de luchtwegen van met het Corona virus besmette personen. Als er procedures uitgevoerd moeten worden bij een (vermoedelijk) besmet persoon, van wie er druppeltjes uit de luchtwegen kunnen vrijkomen, dan moet de medewerker conform de volgende werkwijze handelen. Deze werkwijze komt voort uit o.a. RIVM-adviezen en van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Oefenen in het geven van beademingen

Uit preventief oogpunt is het belangrijk om alle reanimatieoefeningen te stoppen tot nader bericht. Deze maatregel geldt ook voor de door de politie ingehuurde externe bedrijven (zoals BHV).

Daadwerkelijke reanimatie (incl. BPZ)

Beademen is een essentieel onderdeel van de reanimatie. Niet beademen verkleint de kans op een goede afloop. Zorgverleners in een beroepsmatige setting (ziekenhuispersoneel, ambulancehulpverleners, enz.) maken voor het beademen over het algemeen al gebruik van hulpmiddelen die voldoende bescherming bieden tegen besmetting.

Voor de BPZ is het advies om gebruik te maken van de pocketmask en de handschoenen, mondmasker (FFP2), bril en schort uit de coronakit, die in het

dienstvoertuig aanwezig zijn. De Kiss of Life biedt geen bescherming tegen besmetting met het coronavirus. **Let op:** Het mondmasker (FFP2) uit de coronakit kan niet gedragen worden tijdens het beademen, omdat je lucht moet inblazen door het buisje van de pocketmask. Bij setting met twee hulpverleners, kan degene die de borstcompressies geeft wel het mondmasker(FFP2) dragen.

Als er **geen** pocketmask beschikbaar is voor de hulpverlener (die werkzaam is namens de politie) dan is het advies: Geef alleen borstcompressies zonder beademing (draag daarbij mondmasker FFP2, handschoenen, schort en bril).

Dit om de kans corona te krijgen en daarna te verspreiden te verkleinen.

Uiteraard gelden deze adviezen alleen voor een beroepsmatige setting.

Reiniging van de AED en de pocketmask na inzet

Het is belangrijk om na inzet de pocketmask goed te reinigen of als dat niet kan weg te gooien.

- Het maskergedeelte van de pocketmask is opnieuw te gebruiken, maar het filter en de eenrichtingsklep (het losse tuitje) moet met handschoenen verwijderd worden en direct in een vuilniszak gedaan worden.

- Het schort, het mondmasker(FFP2) en de handschoenen moeten ook weggegooid worden.
- Trek de handschoenen daarbij als laatste uit.
- De vuilniszak moet daarna afgesloten worden (trek daarvoor eerst schone handschoenen aan) en kan vervolgens met het reguliere afval afgevoerd worden.
- Was of ontsmet de handen altijd na uittrekken van de handschoenen.

Let op: Het filter van de pocketmask moet steeds vervangen worden na eenmalig gebruik.

Het hardplastic masker gedeelte van de pocketmask kan gereinigd worden conform de adviezen van de fabrikant. Bijvoorbeeld met alcoholdoekjes die daarvoor geschikt zijn. Draag handschoenen bij het schoonmaken.

Voor de AED geldt dat de normale procedure voor reiniging gevolgd wordt.

Wat te doen na mogelijke blootstelling tijdens de reanimatie

Ben je mogelijk blootgesteld tijdens de reanimatie, meldt dit bij je leidinggevende en de VGW-afdeling van je eigen eenheid voor registratie. Houd je gezondheid in de gaten en stem met je leidinggevende af als je klachten krijgt.