

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rotterdam.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Tue 3/17/2020 9:15:37 AM  
**Subject:** RE: PBM beleid bij zwangere met verkoudheid  
**Received:** Tue 3/17/2020 9:15:37 AM

Beste [redacted] 5.1.2e

Er zijn bij ons contacten geweest met de KNOV.  
 Die zijn bezig met hun eigen richtlijn voor het veld en stemmen met ons af.  
 Je kunt naar hen verwijzen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

**RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding**

National Coordination Centre for Communicable Disease Control  
 RIVM - Centre of Infectious Disease Control  
 Office box 1, internal officebox [redacted] 5.1.2e 3720 BA Bilthoven The Netherlands  
 Telephone: +3130 [redacted] 5.1.2e +316 [redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rotterdam.nl>  
**Sent:** maandag 16 maart 2020 18:24  
**To:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** PBM beleid bij zwangere met verkoudheid

Beste voorwacht,

Ik heb donderdag opverleg met de verloskundigen over

Een van de vragen is:

Wanneer moet een verloskundige bij een zwangere PBM toepassen?

*De LCI richtlijn doet nog geen uitspraak of dit al moet bij indicatie voor "social distancing" (neusverkoudheid OF hoesten OF koorts) of de casusdefinitie "koorts + (hoesten OF kortadigheid)". Common sense zou zijn om het laatste te doen, gezien 1. het beperkte risico voor de zorgverlener zelf en 2. de verloskundige als zorgprofessional contact heeft met vrouwen in de reproductieve leeftijd, die geen kwetsbare groep zijn voor COVID-19.*

Wat is jullie advies?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e  
 [redacted] 5.1.2e  
 Gemeente Rotterdam  
 Maatschappelijke Ontwikkeling  
 Mobiel 06 [redacted] 5.1.2e  
 Website

