

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 3/18/2020 7:09:56 AM
Subject: FW: mate van isolatie bij Covid (verdachte) patienten
Received: Wed 3/18/2020 7:09:56 AM

Pakken jullie dit op?

From: [5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: woensdag 18 maart 2020 07:45
To: [5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: FW: mate van isolatie bij Covid (verdachte) patienten

Groet,
 [5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@flevoziekenhuis.nl>
Sent: dinsdag 17 maart 2020 19:04
To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: mate van isolatie bij Covid (verdachte) patienten

Beste,

De richtlijn Covid-19 lezende wordt mij niet voldoende duidelijk welke mate van isolatie-maatregelen nu geadviseerd worden.

Zoals u weet werd aanvankelijk strikte isolatie geadviseerd in een gesluisde kamer met onderdruk.

Ik vind terug dat onderdruk niet meer nodig is.

In onderstaand stuk lees ik dat transmissie via druppels en contact gaat. Dat betekent dat druppel/contact isolatie voldoende zou moeten zijn.

Verderop staat dat aerosolvorming onwaarschijnlijk is, behoudens bij IC handelingen.

Kan hiermee de strikte isolatie middels additionele brillen en mutsen verlaten worden?

Groeten [5.1.2e],

[5.1.2e]

Van website: <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>

3^e blauwe blok:

“ **Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers**

Het gezamenlijk conceptadvies van de NVZ en het RIVM inzake de inzet van zorgprofessionals in ziekenhuizen tijdens een uitbraak van COVID-19, vindt u op de [RIVM-website](#).

Mondneusmaskers

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS-CoV-2 via druppels en (in)direct contact biedt een FFP1-masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19. Uitzondering hierop zijn aerosolvormende handelingen (zie besmettingsweg). Hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd.

Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patiënten, met waarschijnlijk ook een hoge virusload, zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht, waarbij de gezondheidsmedewerker direct betrokken is, wordt voor de IC-zorg van een patiënt met COVID-19 om die reden een FFP2-masker geadviseerd.

Intramurale patiënten dienen te worden verpleegd in een eenpersoonskamer met de deur dicht en op een intensive care op een isolatiekamer. Bij onvoldoende capaciteit is cohortering aangewezen van bekende positieve patiënten. “