

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**Cc:** [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]@lumc.nl  
**Sent:** Mon 3/23/2020 4:03:54 PM  
**Subject:** RE: mondneusmaskers bij monsterafname en lichamelijk onderzoek  
**Received:** Mon 3/23/2020 4:06:33 PM

Ha [redacted]

In principe volstaat chirurgisch masker voor druppels. Het is een barriere tegen de druppels voor neus en mond en dat heb je nodig, want dat is de belangrijkste besmettingsroute.

Hoe lang je ze kan dragen zal afhankelijk zijn van de soort. In ieder geval wisselen als het masker nat is en niet de voorkant aanraken bij afdoen. Ik zou ook masker wisselen als iemand heel erg hoestte waarbij je geen afstand hebt kunnen houden/achter diegene stond.

Bij afname van een keelkweek kan je bijv. ook achter de patient gaan staan en de afnamestok begeleiden terwijl de patient deze zelf vasthoudt om te voorkomen dat je vol in je gezicht gehoest wordt.

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted] Afdeling Medische Microbiologie | Leids Universitair Medisch Centrum [redacted] Postbus 9600  
 | 2300 RC Leiden | [redacted] [redacted]@lumc.nl

[redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**Sent:** maandag 23 maart 2020 16:08

**To:** [redacted]@lumc.nl

**Cc:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**Subject:** mondneusmaskers bij monsterafname en lichamelijk onderzoek

Beste [redacted]

Wij hebben bij de LCI discussie over het type masker dat gebruikt moet worden bij monsterafname en lichamelijk onderzoek (keel) door de huisarts.

Bij de eerdere terugschaling van FFP2 naar FFP1 maskers is gesteld dat ook bij monsterafname FFP1 voldoende is. Dat hebben we toen ook gecommuniceerd naar GGD-en en huisartsen.

Inmiddels is gesteld dat chirurgische mondneusmaskers voldoende zijn voor de verzorging van patienten, maar daarbij is voor zover ik me kan herinneren niet expliciet gesteld dat dit ook geldt voor monsterafname en lichamelijk onderzoek door de huisarts.

We krijgen veel vragen van GGD-en en huisartsenposten (waar ze tegenwoordig vaak een speciale lijn hebben voor patienten met longontsteking/COVID) dat zij alleen nog maar chirurgische maskers krijgen of dat de FFP1 en FFP2 maskers er zelfs opgehaald worden door de ROAZ. Deze GGD- en huisartsen voelen zich door de afschaling nu niet goed beschermd meer.

Dus vandaag de volgende vragen:

1. Volstaat bij monsterafname een chirurgisch mondneusmasker?
2. Volstaat voor een huisarts die luchtwegklachtenspreekuur doet een chirurgisch masker? En kan hij dat dan ook 3 uur ophouden ?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)  
 Postbus 1 (postba[redacted])

3720 BA Bilthoven

Tel: 030 -

5.1.2e

Fax: 030 -

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*