

## Advies BAO 23 november

### Aanwezig:

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.5 5.1.2e 5.1.2e (Veiligheidsregio's), 5.1.2e  
 5.1.5 5.1.2e 5.1.2e (GGD), 5.1.5 5.1.2e 5.1.2e (VNG) 5.1.2e  
 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e 5.1.2e (AZ), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.5 (NCTV), 5.1.5 (OCW),  
 5.1.2e 5.1.2e (vz), 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.5 5.1.2e 5.1.2e  
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en  
 5.1.2e 5.1.2e (allen VWS)

### OMT advies

#### Verloop van de epidemie

De daling in het aantal meldingen van SARS-CoV-2 positief geteste personen stagneert de laatste dagen, de R is waarschijnlijk zelfs licht boven de 1, de verminderde compliance aan de maatregelen speelt hierbij een rol. De mobiliteitsindicatoren geven bijvoorbeeld aan dat het thuiswerken in Nederland nauwelijks is toegenomen.

Als de dalende trend zou worden vastgehouden zoals de afgelopen weken, wordt verwacht dat we half december (marge: eind november, half februari) op een incidentie komen van 10 IC-opnames per dag. Als het aantal SARS-CoV-2-positief geteste personen verder stabiliseert of zelf weer toeneemt, is de verwachting dat dit zich ook vertaalt in stagnatie van de daling van ziekenhuisopnames.

#### Aanpassing maatregelenpakket

Het OMT benadrukt dat het aanpassen van maatregelen onder de huidige omstandigheden van stagnatie in de daling van het aantal besmettingen, een belangrijk risico vormt op nieuwe besmettingen en extra belasting van de zorg met zich meebrengt. Om die reden adviseert het OMT vanuit het oogpunt van het beheersen van de epidemie, geen mitigatie van de maatregelen in december, dus ook geen ruimte om restaurants open te stellen.

Het OMT wil graag onderzocht zien of het mogelijk is de afname van het aantal COVID-19-gevallen te ondersteunen door de kerstvakantie van scholen met een week te verlengen c.q. een week eerder te laten aanvangen. Een dergelijke interventie heeft naar verwachting een gunstig effect op de R.

#### Signaalwaarden in de routekaart

In het 81e OMT advies heeft het OMT al uiteengezet dat voor de-escalatie een stappenplan met andere signaalwaarden nodig is en niet dezelfde stappen in omgekeerde richting gevolgd kunnen worden. Bij escalatie wil je op tijd naar een nieuwe fase, bij de-escalatie wil je niet te vroeg versoepelen. Het OMT stelt indicatoren met bijpassende drempelwaarden voor om in niveau 1 'waakzaam' te komen én te blijven. Deze bestaan onder andere uit een incidentie van meldingen van minder dan 7 per 100.000 per dag (herberekenen bij aanpassing testbeleid), volledig operationeel BCO en R onder de 1.

#### Grootschalig en frequenter testen

Het OMT maakt op dat er 3 mogelijke redenen zijn om over te gaan tot grootschalig en/of frequent testen van personen zonder klachten:

1. Een eenmalige test van een grote groep mensen om de besmettingen in detail in kaart te brengen, waarna specifieke bestrijdingsmaatregelen volgen.

2. Een eenmalige test voorafgaand aan specifieke bijeenkomsten zoals grote evenementen.
3. Om de maatschappij 'te openen' en andere bestrijdingsmaatregelen zoals social distancing te vervangen.

Voor wat betreft de eerste 2 van bovengemelde 3 redenen tot testen van personen zonder klachten, verwacht het OMT een toegevoegde waarde. De derde toepassing brengt grote risico's met zich mee, terwijl de toegevoegde waarde nog aangetoond moet worden.

Het OMT bereidt een notitie voor waarin deze aspecten verder worden uitgewerkt. Deze notitie wordt binnenkort verwacht (1-2 weken).

#### Overige

Het OMT acht een aangepast testbeleid voor kinderen van zorgmedewerkers niet nodig.

Gelet op de huidige ontwikkelingen met een toename van het aantal besmettingen en uitbraken in verpleeghuizen, is gekozen prioriteit te geven aan de evaluatie van de implementatie van het testbeleid bij uitbraken. Tevens zal een studie uitgevoerd worden naar de klinische validatie en implementatie van antigeensneltesten in het kader van BCO in verpleeghuizen.

#### **BAO-advies**

Het BAO heeft kennisgenomen van het epidemiologisch beeld. In het advies wordt een waarde voor het reproductiegetal genoemd van 0,99 op basis van het aantal positieve meldingen. De waarde voor het reproductiegetal berekend op basis van ziekenhuisopnames en IC-opnames is 0,94. Deze R-waarden zijn gebaseerd op gegevens van 5 november.

5.1.2i

5.1.2i

Het BAO heeft benadrukt dat duidelijkheid en een duidelijk perspectief belangrijk is, ook om de samenleving geen valse hoop te geven.

Met betrekking tot signaalwaarden in de routekaart neemt het BAO het advies van het OMT over.

Ten aanzien van grootschalig testen onderschrijft het BAO het risico bij gebruik om de maatschappij te openen en wacht de notitie van het OMT met de nadere uitwerking af.