

To: [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted]@bonairegov.com; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@bonairegov.com; [redacted]@bonairegov.com; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@gmail.com; [redacted]@gmail.com
From: [redacted]
Sent: Sun 4/12/2020 7:58:03 PM
Subject: RE: Doorst: Corona op Bonaire
Received: Sun 4/12/2020 7:58:10 PM

Hoi [redacted]

Ik denk dat ik het hiermee wel ga redden..

Thanx!

Buiten reikwijdte

Gr. [redacted]

[redacted]

Woordvoerder RIVM

Tel. [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Datum: 12 april 2020 om 21:50:21 CEST

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>,
 [redacted] <[redacted]@bonairegov.com>, [redacted] <[redacted]@bonairegov.com>,
 [redacted] <[redacted]@bonairegov.com>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>,
 [redacted] <[redacted]@gmail.com> <[redacted]@gmail.com>

[redacted] <[redacted]@bonairegov.com>, [redacted] <[redacted]@bonairegov.com>,
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>,
 [redacted] <[redacted]@gmail.com> <[redacted]@gmail.com>

[redacted] <[redacted]@gmail.com> <[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: RE: Doorst: Corona op Bonaire

Hoi [redacted]

Ik houd niet precies bij wat er allemaal bij ons op de site staat, maar de volgende tekst staat in het RRA van de ECDC (do 9 april, 8^e versie), voor mij toch wel een belangrijke bron:

Viral shedding Over the course of infection, the virus has been identified in respiratory tract specimens 1–2 days before the onset of symptoms, and it can persist for up to eight days after the onset of symptoms in mild cases [27] and for longer periods in more severe cases, peaking in the second week after infection [27,28]. The high viral load close to symptom onset suggests that SARS-CoV-2 can be easily transmissible at an early stage of infection [29]. Viral RNA has been detected in faeces [30], whole blood [20], serum [31,32], saliva [26,29], nasopharyngeal specimens [21] and urine [33]. It should be noted that detection of viral RNA by PCR does not equate with infectivity, unless infectious virus particles have been confirmed through virus isolation and cultured from the particular samples. For more information on viral shedding, please refer to ECDC's seventh update of the risk assessment [34].

Infection in asymptomatic individuals

Asymptomatic infection at time of laboratory confirmation has been reported from many settings [35-38]. Some of these cases developed some symptoms at a later stage of infection, however, the proportion is not yet fully understood [39,40]. There are also reports of cases remaining asymptomatic throughout the whole duration of laboratory monitoring, which revealed viral RNA shedding in various sample types. A recent modelling study suggested that asymptomatic individuals might be major drivers for the growth of the COVID-19 pandemic [41]. For more information on asymptomatic infection, please refer to the ECDC's seventh update [34].

Transmission by pre-symptomatic individuals

Pre-symptomatic transmission has been reported; exposure in these cases occurred 1–3 days before the source patient developed symptoms [42]. It has been inferred through modelling that, in the presence of control measures, pre-symptomatic transmission contributed to 48% and 62% of transmissions in Singapore and China (Tianjin data), respectively [43]. Although transmission from asymptomatic patients has also been reported, the risk of transmission from pre-symptomatic or symptomatic patients is considered to be higher; viral RNA shedding

is higher at the time of symptom onset and declines after days or weeks [29]. For more information on presymptomatic infection, please refer to the ECDC's seventh update [34].

Wat mij betreft is er niet veel discussie over de mogelijkheid van besmettelijkheid voordat er klinische symptomen zijn. Over de precieze betekenis en kwantificering kun je waarschijnlijk nog lang soebatten. Punt is dat de eilanden gaan voor containment, ze willen het virus niet of minimaal op het eiland. Vandaar dat ze terecht eisen dat mensen die uit een land met veel transmissie onder de bevolking zoals Nederland gaan voor een quarantainebeleid.

Ik denk dat de overheid voor zekere individuen weinig vertrouwen heeft dat ze zich hier strikt aan zullen houden, vandaar dat ze gaan voor een centrale quarantainevoorziening. Lijkt me niet onredelijk, ik ken de precieze afwegingen niet, ben niet bij de discussies met de eilandelijke overheid betrokken geweest.

Er is behoorlijk wat gedoe en weerstand tegen deze maatregel, vandaar ook de belangstelling van de pers. Een en ander wordt gedekt door de WPG, maar men verwacht hiertegen nog wel gerechtelijke processen of kort geding om e.e.a. aan te vechten.

Ik hoop dat e.e.a. zo voldoende duidelijk is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: zaterdag 11 april 2020 17:30
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Doorst: Corona op Bonaire

Hoi 5.1.2e

Zie onder, weet jij hier meer van.?

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Woordvoerder RIVM

Tel. 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

5.1.2e