

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]  
**From:** [redacted] [redacted] 5.1.2i  
**Sent:** Wed 4/1/2020 10:29:11 AM  
**Subject:** FW: Otoscopie door audiciens  
**Received:** Wed 4/1/2020 10:29:11 AM

-----Original Message-----

**From:** [redacted] [redacted] 5.1.2i <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 1 april 2020 11:11  
**To:** [redacted] [redacted] 5.1.2i <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Otoscopie door audiciens

Moet ik deze meneer verwijzen naar....?

Groet,  
[redacted] 5.1.2e

-----Original Message-----

**From:** [redacted] [redacted] 5.1.2e <[redacted]@gmail.com>  
**Sent:** woensdag 1 april 2020 11:09  
**To:** [redacted] [redacted] 5.1.2i <[redacted]@rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] [redacted] 5.1.2e <[redacted]@casema.nl>; [redacted] [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wispa.nl>  
**Subject:** Otoscopie door audiciens

Zeer geachte collegae,

Als vice-voorzitter van het kwaliteitskeurmerk voor audiciens " StAr", een landelijke organisatie ( erkenningen, kwaliteitsaudits etc), en tevens als KNO-arts in dit gremium, wil ik u het volgende vragen:

Wat is uw advies voor de handeling " Otoscopie beiderzijds" door de audicien bij cliënten, zonder aanwijzingen op de aanwezigheid van Corona-virus, maar meestal op hogere leeftijd, die een ( wisselend) ernstige klacht hebben over toegenomen gehoorverlies, bij het reeds dragen van een hoortoestel.

Gebruikelijk volgt er dan een triage met anamnese, gevolgd door otoscopie. Controle-Audiometrie behoort soms ook tot de mogelijkheden. Altijd kan het hoortoestel op technische mankementen worden gecontroleerd op een veilige manier.

Concreet: kn otoscopie worden verricht door de audicien zonder ( of juist met) PBM.

Ik verneem graag uw antwoord.

Vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e