

To: 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 4/20/2020 8:29:38 AM
Subject: RE: Corona tips Soa poli
Received: Mon 4/20/2020 8:29:38 AM

Hoi 5.1.2e

Het afnemen van een keeluitstrijk voor SOA diagnostiek is geen aerosolvormende handeling.
Er zijn verschillende scenario's:

1. geen klachten, maar wel indicatie om keeluitstrijk af te nemen voor SOA diagnostiek: geen PBM nodig
2. keelklachten en/of koorts verdenking SOA/indicatie om SOA keeluitstrijk of te nemen: keelklachten en/of koorts kunnen tekenen van COVID-19 zijn. Bij dergelijke klachten is het nodig om PBM te dragen. Overweeg of keeluitstrijk nodig is, is blind behandelen een optie?

5.1.2e

Van: 5.1.5 <5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: maandag 20 april 2020 07:36
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: FW: Corona tips Soa poli

Hoi 5.1.2e

Heb jij nog suggesties wat we hier zouden kunnen antwoorden? Bij afnemen keel-neuskweek en symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 (dus ook koorts) om dann toch maar een FFP1 (dus geen FFP2) op te doen of gaat dat te ver? Geen kweek afnemen dan? Of Alleen chirurgisch mondneusmasker?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e MSc

5.1.2e

.....
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer 5.1.2e Postbak 5.1.2e
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T
N
F
E 5.1.2e @rivm.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 16 april 2020 13:18
Aan: 5.1.5 <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Corona tips Soa poli

Dag mensen,

Onderstaande vraag kwam bij ons binnen van de Soa poli. Ik vermoed dat meer Soa poli's hier tegenaan lopen.
Soms ontvangen ze cliënten die geen hoestklachten hebben maar wel bijv. koorts/vergrootte lymfeklieren, mogelijk door de Soa die ze hebben.

Ik kan redeneren dat er geen mondneusmasker nodig is, omdat we ervanuit gaan dat keel/neus kweek afname al geen aerosolvormende handeling is, maar wil graag jullie advies horen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

GGD Amsterdam

5.1.2e

5.1.2e [@ggd.amsterdam.nl](mailto:5.1.2e@ggd.amsterdam.nl)

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 16 april 2020 11:18

Aan: 5.1.2e

CC: 5.1.2e

Onderwerp: FW: Corona tips Soa poli

Urgentie: Hoog

Hallo 5.1.2e

Zie onderstaande vraag van 5.1.2e uit ons artsen overleg.

We hebben dit punt wel besproken tijdens de rondgang op de poli. maar komt niet terug in je advies.

Wij willen natuurlijk als zorgmedewerkers de werkelijke risicoschatting weten van besmetting.

De kans is misschien klein, hoewel we dit niet weten bij soa in de keel (en het hebben van het corona virus zonder klachten van hoesten.)

Nu nemen we onbeschermd kweken af bij klachten in de keel.

Het komt niet vaak voor maar gebeurt wel.

Uiteraard begrijp ik dat je hierover even wilt overleggen met je achterban of misschien zelfs het RIVM?

Kortom; Wat is jullie risico inschatting en advies bij het afnemen van keelkweek bij klachten veroorzaakt door of verdenking op soa in de keel (noodzakelijke zorg)?

(Dit zijn bijv. mensen zonder hoestklachten maar met keelklachten, gezwollen lymfeklieren klieren in de hals wondjes in de keel enz enz)

Wil je je advies mailen?

Nogmaals; we zijn erg blij met jullie support,

Groet,

5.1.2e