

april 2020



Rijksoverheid

Wanneer is welk schort nodig?

- | | |
|---|--|
| <p>1 Hoog risico handelingen. Waarbij het bekend is dat er grote hoeveelheden aerosolen ontstaan. Aerosolen vergroten de kans op besmetting van zorgmedewerkers. Dit betreft onder andere: tracheale intubatie, bronchoscopie, uitzuigen van bovenste en onderste luchtwegen, handmatige beademing voor intubatie, niet-invasieve positieve druk beademing (NIPPV), tracheostomie, cardiopulmonale reanimatie en acute specialistische mondzorg voor COVID-19-patiënten.</p> <p>Zuurstoftoediening via nasale zuurstofcatheter of masker en afname van nasopharynxwat en keelwat voor diagnostiek zijn geen aerosolvormende handelingen.</p> | <p>1 Disposable schort met lange mouwen</p> |
| <p>2 Hoge intensiteit van (mogelijke) blootstelling aan SARS-CoV-2. Hieronder wordt verstaan een workflow waarbij risicomomenten gecombineerd worden, bijvoorbeeld bij monsterafname in een "monsterstraat", een COVID-19-verdenking-spreekuur op een huisartsenpost of cohortverpleging op een COVID-19-afdeling.</p> | <p>Disposable schort met lange mouwen/ dienstkleeding met halterschort</p> |
| <p>3 Verpleging of verzorging van individuele COVID-19-patiënten. Het gaat volgens de LCI-richtlijn Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis om handelingen waarbij direct patiëntcontact plaatsvindt met een (verdachte) patiënt en sprake is van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Het gaat niet om handelingen op meer dan 1,5 meter afstand of om vluchtig contact.</p> | <p>2 Disposable schort met lange mouwen/ dienstkleeding met halterschort</p> |
| <p>4 Spoedeisende zorgverlening bij een patiënt met (onverwachte) COVID-19-verdenking. De spoedeisendheid wordt vastgesteld door de centralist van de meldkamer, de triagist van de huisartsenpost of de potentiële behandelaar op basis van de urgentie van de zorgvraag volgens het Nederlandse Triage Systeem.</p> <p>Incidenteel contact binnen 1,5 meter met een onbekende persoon in de openbare ruimte valt hier niet onder.</p> | <p>3 Disposable schort met lange mouwen/ dienstkleeding met halterschort</p> |
| <p>5 Bloedprikken (door laboratoria, trombosediens en in klinische instellingen). In geval van symptomatische COVID-19-klachten.</p> <p>In gevallen waarin de patiënt niet aanhoest en er sprake is van een vluchtig contact (vingerprik, zelfafname).</p> | <p>4 Disposable schort met lange mouwen¹</p> <p>Geen</p> |
| <p>6 Begeleiding. Dit betreft vormen van begeleiding in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en Beschermd Wonen. In het algemeen kan worden volstaan met begeleiding op afstand van 1,5 meter of vluchtig contact.</p> <p>Als er sprake is van onvermijdelijk contact bij verzorging of verpleging van patiënten met COVID in deze voorzieningen door een (wijk-)verpleegkundige.</p> | <p>5 Disposable schort met lange mouwen/ dienstkleeding met halterschort</p> <p>Geen</p> |
| <p>7 Huishoudelijke hulp bij patiënten met COVID-19. Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt om een afstand van 1,5 meter aan te houden, of te beperken tot vluchtig contact.</p> | <p>6 Geen</p> <p>Disposable schort met lange mouwen/ dienstkleeding met halterschort</p> |
| | <p>7 Dienst- of werkkleding²</p> |

¹ Ambulancedienst draagt vaak overalls volgens eigen protocollen

² Eigen kleding die alleen tijdens werk wordt gedragen

Richtlijnen voor gebruik

- Een disposable schort moet spatwaterdicht zijn.
- Vervang het schort als het besmet is met lichaamsvocht, bij beschadiging, consumptie van eten en drinken en bij het verlaten van een cohort.
- Een disposable schort moet patiëntgebonden gebruikt worden. Dienstkleding kan wel bij meerdere patiënten gedragen worden.
- Voor hergebruik kan een disposable schort patiëntgebonden gebruikt worden voor de duur van een dienst. Hiervoor zijn er twee opties:
 - Als het schort kan worden opgehangen buiten de kamer van de patiënt: binnenstebuiten ophangen.
 - Als het schort in de patiëntkamer moet opgehangen: buitenkant naar buiten.
- Een halterschort wordt gedragen boven dienstkleding met bij voorkeur korte mouwen.