

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl
From: /O=RIVM ORGANIZATION/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=A87D40FA4A6241F287C006859514FED1-VLIETV
Sent: Mon 3/15/2021 7:22:49 AM
Subject: RE: Doorst: Antw: richtlijn RIVM
Received: Mon 3/15/2021 7:25:00 AM

Hoi [5.1.2e]

De reden dat het niet zo expliciet benoemd staat, is omdat dit een algemeen immunologisch gegeven is dat langere intervallen geen probleem zijn, zie bijv. richtlijn RVP: [10. Inhaalschema's | Rijksvaccinatieprogramma.nl](#)

Daar staat: Bij het inhaalschema heeft een langer interval tussen de vaccinaties de voorkeur boven een kort interval, zoals dat bij de reguliere schema's voor zuigelingen ook het geval is. Ook op de leeftijd van 1 jaar of ouder geldt dat langere intervallen betere titers opleveren.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Werkdagen: [5.1.2e]

Kamer [5.1.2e]

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus [5.1.2e] [5.1.2e]
3720 BA Bilthoven

Telefoon (030) [5.1.2e]

Telefoon mobiel: 06. [5.1.2e]

[5.1.2e] @rivm.nl

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins>

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Verzonden: zondag 14 maart 2021 15:44

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Onderwerp: Doorst: Antw: richtlijn RIVM

[5.1.2e]

Zou jij een voorzet kunnen geven voor een antwoord? de journaliste van radar vindt onze richtlijn voor tweede prik niet helemaal duidelijk. Ik begrijp wel wat ze bedoelt. Staat er nog ergens expliciet genoemd in de richtlijn dat uitstel van tweede prik niet erg is?

Heb nog even doorgelezen in de richtlijn van CDC, en daar vind ik dit:

If it is not feasible to adhere to the recommended interval and a delay in vaccination is unavoidable, the second dose of Pfizer-BioNTech and Moderna COVID-19 vaccines may be administered up to 6 weeks (42 days) after the first dose.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@avrotros.nl>

Datum: 12 maart 2021 om 22:07:24 CET

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Onderwerp: Re: Antw: richtlijn RIVM

Er staat toch ook:

Toediening

Comirnaty wordt intramusculair (i.m.) toegediend in de bovenarm (m. deltoïdeus). Als er niet in de bovenarm gevaccineerd kan worden, kan de vaccinatie in het bovenbeen worden toegediend (m. vastus lateralis).

De volledige serie bestaat uit 2 doses van 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml). Het interval dat vanaf medio januari 2021 gehanteerd wordt tussen de twee doses is 35-42 dagen. Dat is langer dan het standaard interval van 21 dagen dat in de bijsluiter vermeld staat en tot medio januari gehanteerd werd. Op basis van het [gezamenlijk advies](#) van de Gezondheidsraad en het OMT heeft de minister van VWS besloten om dit interval te verlengen. In de effectiviteitsstudie van Comirnaty zijn deelnemers geïncubeerd die een tweede dosis kregen tot 42 dagen na de eerste dosis. Daarnaast is dit interval conform [het recente WHO-advies](#). De verlenging van het interval geeft de mogelijkheid om op korte termijn meer mensen de eerste vaccinatie te geven. **Vanaf 21 januari 2021 worden nieuwe afspraken voor de tweede vaccinatie gepland in de zesde week na de eerste vaccinatie, 35-42 dagen na de eerste vaccinatie. Als dat niet lukt, dient de afspraak eerder gemaakt te worden.**

In de SmPC wordt een interval van 21 dagen aanbevolen. Het is onwenselijk om een korter interval te hanteren dan 21 dagen. In de klinische studie werd een minimum interval van 19 dagen aangehouden, maar de EMA heeft dit niet overgenomen. **Als de tweede vaccinatie buiten het geadviseerde interval valt – dus eerder of later is toegediend – hoeft de vaccinatieserie niet opnieuw te worden gestart.** Er hoeft geen derde vaccinatie gegeven te worden. Zie ook [de richtlijn van de CDC](#).

Ik maak hier niet uit op dat het niet uitmaakt wanneer de tweede prik gegeven wordt. Alleen dat er geen derde prik nodig is....

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 12 mrt. 2021 om 21:20 heeft [5.1.2e](#) [5.1.2e](#) < [5.1.2e](#) [@rivm.nl](#)> het volgende geschreven:

Excuses, heb er vanmiddag niet meer aan gedacht.

De richtlijn kun je hier vinden: <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie>.

Daarin staat in hoofdstuk 5, bij informatie over Biontech/Pfizer, onder "toediening", in de laatste alinea dat als de tweede vaccinatie buiten de geadviseerde interval valt, de vaccinatieserie niet opnieuw hoeft worden gestart.

Vriendelijke groet,

[5.1.2e](#)

Van: [5.1.2e](#) < [5.1.2e](#) [@avrotros.nl](#)>

Datum: 12 maart 2021 om 19:11:56 CET

Aan: [5.1.2e](#) [5.1.2e](#) < [5.1.2e](#) [@rivm.nl](#)>

Onderwerp: richtlijn RIVM

Beste [5.1.2e](#)

Ik ben nog in afwachting van je bericht. Zou jij mij nog de tekst / richtlijn kunnen sturen waar staat dat er geen maximumtermijn meer zit tussen het eerste Covid-vaccin en de tweede inenting? Bedankt alvast.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e](#)

[5.1.2e](#)

T. +31 [5.1.2e](#)

E: [5.1.2e](#) [@avrotros.nl](#)

Witte Kruislaan 55

Postbus 2 1200 JA Hilversum



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*