

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbzk.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @zorgverzekeringskantoor.nl]
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl]
From: 5.1.2e [redacted]
Sent: Mon 3/8/2021 10:45:18 AM
Subject: Updates in uitvoeringsrichtlijn vaccinaties
Received: Mon 3/8/2021 10:45:18 AM

Hi teamgenoten,

Ik ben de updates in de uitvoeringsrichtlijn vaccinaties van het RIVM aan het bekijken. De belangrijkste (voor ons):

- De handleiding voor vaccinatie van immuunpromitteerde patiënten is aangepast. Hoewel voor hoog-risicogroepen een mRNA-vaccin de voorkeur blijft hebben, is in deze fase van de pandemie snellheid van vaccinatie voor het bereiken van bescherming belangrijker dan vaccinkeuze. Dit betekent dat in ENL personen uit de vier hoog-risicogroepen (hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar; nierfalen of (pre-)dialyse; status na orgaan- of stamcel of beenmergtransplantatie; een ernstige primaire immuundeficiëntie) van 60-64 jaar eerder worden opgeroepen voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin (via de huisarts of via hun werkgever in geval van zorgpersoneel);
- Wanneer tweede vaccinatie buiten het geadviseerde interval valt (eerder of later), hoeft de vaccinatieserie niet opnieuw te worden gestart. Een derde vaccinatie hoeft niet te worden gegeven. Ook wanneer de tweede vaccinatie is toegediend met een vaccin van een ander merk, hoeft er geen derde vaccinatie gegeven te worden;
- Er is een handreiking toegevoegd voor artsen om te beoordelen of iemand die een allergische reactie heeft gehad bij de eerste dosis wel of geen tweede dosis zou moeten ontvangen;
- Er is aanvullende tekst opgenomen over acute bijwerkingen na vaccinatie. Veel mensen ('een aanzienlijk deel') hebben last van koorts, hoofdpijn, moeheid, spierpijn, pijnlijke gewrichten, rillingen en misselijkheid, dat geldt voor alle drie de vaccintypes (Pfizer, Moderna, AstraZeneca). De klachten zijn uitgesprokener bij jongeren dan bij ouderen en nemen toe bij de tweede vaccinatie in geval van Pfizer en Moderna;
- In afwachting van het advies van de GR is het 'te overwegen' om de tweede dosis voor mensen die al Covid-19 hebben doorgemaakt uit te stellen;
- De NVZA heeft samen met GGD GHOR Nederland een procedure ontwikkeld voor het doortrekken van één vaccinflacon Comirnaty (Pfizer) naar de volgende vaccinflacon Comirnaty (Pfizer) om zoveel mogelijk doses uit de vaccinflacons te kunnen halen. Apothekers mogen GGD-medewerkers volgens het landelijk protocol van de NVZA trainen in het werken met deze techniek. Een apotheker verklaart medewerkers individueel bekwaam als "vaccinvoorbereider plus". Vanaf dat moment mag de bekwaam verklaarde medewerker zelfstandig, zonder aanwezigheid van de apotheker, de techniek toepassen. De GGD houdt een register van bekwame "vaccinvoorbereiders plus" bij, zowel ten behoeve van de eigen organisatie als ten behoeve van de IGJ.

Groet,

5.1.2e [redacted]