

To: 5.1.2e @gzasielzoekers.nl; 5.1.2e @gzasielzoekers.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @coa.nl]
 Cc: 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
 From: /O=RIVM ORGANIZATION/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=181090F7C8AC4DE8AD00405E31974EFC-THIESC
 Sent: Tue 3/16/2021 6:43:55 PM
 Subject: verschillen tussen Moderna en AstraZeneca
 Received: Tue 3/16/2021 7:19:00 PM
[COVID-vaccinaties door huisarts GZA aan asielzoekers.pdf](#)

Hoi 5.1.2e

De 65+ cliënten worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Hieronder de verschillen tussen Moderna en AstraZeneca.

Fabrikant	Soort vaccin	Dosis	Aantal doses	Streef-interval in weken	Minimum-interval in dagen	Window-interval in dagen
Moderna	mRNA	100µg (0,5ml)	2	4 weken	25	25-35*
AstraZeneca	recombinant vector	2,5 x 10 ⁸ Inf. U. (0,5ml)	2	in de 12e week	28	84

* In de SmpC staat dat in de effectiviteitsstudie vooraf aan de registratie vrijwel alle personen de tweede dosis 25-35 dagen na de eerste dosis ontvingen. Dit interval kan nog aangepast worden als er meer informatie beschikbaar is.

De houdbaarheid en bewaarcondities zijn per vaccin verschillend. Daarnaast dient elk vaccin op een specifieke wijze voor toediening gereed gemaakt te worden. In de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie van het RIVM (<https://ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#5-3-covid-19-vaccine-moderna>) staan de specifieke eisen en condities beschreven. Hieronder in het kort (dd 16-3-2021)

Houdbaarheid MODERNA	<2°C	2-8°C	8-25°C
Vaccinflacon onaangeboden	cold chain-incident: zie NB. 1	Tot de "te gebruiken datum" (staat vermeld op de verpakking) (30 dagen na verwijdering uit de vriezer)	12 uur (na verwijdering uit de koelkast)
Vaccinflacon aangeprikt	cold chain-incident: zie NB. 1	Zo spoedig mogelijk gebruiken (uiterlijk binnen 6 uur na aanprikken flacon en uiterlijk 12 uur na verwijderen onaangeboden flacon uit koelkast; daarna is vaccin niet meer bruikbaar)	Zo spoedig mogelijk gebruiken (uiterlijk binnen 6 uur na aanprikken flacon en uiterlijk 12 uur na verwijderen onaangeboden flacon uit koelkast; daarna is vaccin niet meer bruikbaar)
Vaccin opgetrokken in spuit	cold chain-incident: zie NB. 1	Direct gebruiken	Direct gebruiken
Transport MODERNA	<2°C	2-8°C	8-25°C
Auto, fiets of lopend Vaccinflacon, zowel onaangeboden als aangeprikt (vervoeren zonder optreknaald)	cold chain-incident: zie NB. 1	3 uur	cold chain-incident: zie NB. 1
Lopend binnen een locatie Vaccin opgetrokken in spuit	cold chain-incident: zie NB. 1	Alleen lopen van voorbereidingsplaats naar toedieningsplaats (op 1 etage)	Alleen lopen van voorbereidingsplaats

NB. 1: Bij een mogelijke afwijking van de temperatuur (dus buiten de 2-8°C) en bij andere incidenten waarbij het vaccin betrokken is geweest (bijvoorbeeld te lang gewacht met toedienen), moet de uitvoerende organisatie direct telefonisch contact op nemen met RIVM-DVP via telefoonnummer 088-678 8900. Zie [paragraaf 7.2](#) van de uitvoeringsrichtlijn.

Aandachtspunt bij 2^e vaccinatie

Afhankelijk van de planning kan het zijn dat de arts bij de 2^e vaccinatieronde van de 65+ met Moderna, ook beschikt over het AstraZeneca vaccin voor vaccinatie van 64-60 jarigen en medische hoog-risicogroepen (Syndroom van Down en morbide obesitas).

Mee te sturen bijlagen voor GZA artsen:

- COVID-vaccinaties door huisarts GZA aan asielzoekers
- Landelijk draaiboek (wij zagen een verwijzing in de bijlage hiernaar, mogen wij deze ook ontvangen)
- [Checklist overdracht Moderna flacons](#)
- [LCI instructie klaarmaken vaccin Moderna](#)
- ...?

Schroom niet om ons te bellen, indien jullie vragen hebben

Hartelijke groet

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Projectbureau Covid-19 vaccinatie

5.1.2e 5.1.2e

TEL: 06- 5.1.2e

5.1.2e [@nvm.nl](mailto:5.1.2e@nvm.nl)

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Programma Covid-19 vaccinatie
.....