

To: [redacted] 5.1.2e - Doktersdienst Groningen [redacted] 5.1.2e @doktersdienstgroningen.nl]
From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 3/23/2021 9:25:05 AM
Subject: RE: [SNPG] - Bevestiging gewijzigde bestelling COVID-19 vaccins
Received: Tue 3/23/2021 9:25:05 AM

Hi [redacted] 5.1.2e ik heb je net een mail gestuurd mbt bijstelling levering. Als ik de complete lijst rond heb stuur ik dit door naar de logistieke collega's.

Komende levering ontvangen jullie 31 dozen ipv 38 dozen, verrekening van de 73 flacons die via vaccinmakelaar een andere bestemming hebben gekregen.

Groet, [redacted] 5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] 5.1.2e - Doktersdienst Groningen <[redacted] 5.1.2e @doktersdienstgroningen.nl>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 10:21
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: FW: [SNPG] - Bevestiging gewijzigde bestelling COVID-19 vaccins

Goedemorgen [redacted] 5.1.2e

Graag je aandacht voor twee onderwerpen.

1. Bij de bestelling van Moderna vaccins voor de eerste vaccinatieronde zijn ons op 3 maart naast de 3800 vaccins voor ons zelf op jouw verzoek ook 400 vaccins voor de CH Drenthe geleverd. Die 400 hebben wij vervolgens op transport gezet naar de CHD.

Nu kondigt de SNPG voor de levering op 31 maart van vaccin voor de tweede ronde aan (zie de bijlage) weer 4200 vaccins te leveren. Dit is niet de bedoeling!

Wil jij er voor zorgen dat wij 31 maart 3800 vaccins ontvangen?

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] 5.1.5 @snpg.nl <[redacted] 5.1.5 @snpg.nl>
Verzonden: maandag 1 maart 2021 11:09
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @doktersdienstgroningen.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @doktersdienstgroningen.nl>
Onderwerp: [SNPG] - Bevestiging gewijzigde bestelling COVID-19 vaccins

Geachte heer/mevrouw,

Uw bestelling van COVID-19 vaccins met bestelnummer 135788 en besteldatum 26-02-2021 is gewijzigd. Alle voorgaande bestellingen van vaccins zijn hierdoor komen te vervallen. Voor de details verwijzen wij u naar de bijlage.

Reden van wijziging:

Wijziging bestelling in overleg met RIVM

2. Wij vragen ons af hoe om te gaan met het vaccineren van Covid-19 doorgemaakt en vaccineren, zie onderstaand het bericht van het LCI.

Heeft de minister inmiddels al een besluit genomen?

Hoe luidt jullie advies nu?

COVID-19 doorgemaakt en daarna eenmaal gevaccineerd De Gezondheidsraad heeft op 8 maart jl. geadviseerd om mensen die in de afgelopen 6 maanden aantoonbaar COVID-19 hebben doorgemaakt met 1 dosis te vaccineren. Dit advies is nog niet overgenomen door de minister, maar zal eerst op de implicaties voor de uitvoering en de vaccinatiestrategie worden afgewogen. Voor mensen die vragen hebben over hun tweede vaccinatie en niet kunnen wachten op de besluitvorming en implementatie, wordt de onderstaande werkwijze als tussenoplossing geadviseerd.

Voor mensen die in de 6 maanden voorafgaand aan de vaccinatie aantoonbaar COVID-19 hebben doorgemaakt – symptomatisch of asymptomatisch – is 1 vaccinatie voldoende. Met aantoonbaar wordt bedoeld dat er met een gevalideerde test een Sars-CoV-2-besmetting is aangetoond. Dat kan met iedere gevalideerde test die beschikbaar is; dus antigeen(snel)test, PCR, serologische test of een nieuwe test die nog ontwikkeld wordt. Deelnemers mogen dit mondeling aangeven, er hoeft geen 'bewijs' geleverd te worden. Uit recente onderzoeken blijkt dat vaccinatie een goede boosterrespons geeft na doormaken van COVID-19 (Manisty 2021, Prendecki 2021, Saadat 2021). De termijn van maximaal 6 maanden na een positieve test wordt gehanteerd door de Gezondheidsraad, omdat op basis van de huidige kennis wordt verwacht dat de opgebouwde antistofniveaus en het immuungeheugen voor ten minste een half jaar persisteren (Dan 2021, Den Hartog 2021). Na een doorgemaakte infectie is een tweede vaccinatie dan niet nodig. Een specifieke voorkeur voor een

vaccintype (mRNA-vaccin of virusvectorvaccin) bij de eenmalige dosis na eerder doorgemaakte COVID-19 is er niet, omdat elk type vaccin een sterke boosterrespons van de verkregen natuurlijke immuniteit na infectie geeft. Een doorgemaakte infectie is echter geen contra-indicatie voor een tweede vaccinatie (medisch gezien kan het geen kwaad). Na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie en vervolgens vaccinatie kunnen meer bijwerkingen optreden. In het algemeen (ook zonder COVID-19) kunnen na een tweede mRNA-vaccinatie meer bijwerkingen optreden, terwijl dit niet zo zou zijn na de tweede AstraZeneca-vaccinatie. Voor mensen uit de hoogrisicogroepen: zie tekst hieronder.SNPG

Met vriendelijke groet,